

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 43 / 25 Ιουλίου 2016

ΠΕΛΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ - ΑΝΑΡΣΙΑ - ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, **Lepidoptera: Gelechiidae**,

Anarsia lineatella Zeller, **Lepidoptera: Gelechiidae**,

Grapholitha molesta Busck, **Lepidoptera: Tortricidae**)

- Ξεκίνησε η 3^η πτήση του Φυλλοδέτη με μειωμένες συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων.
- Η πτήση της Ανάρσιας συνεχίζεται με σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων.
- Ο Βλαστορύκτης (Καρπόκαψα ροδακινιάς) εμφανίζει αυξημένες συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων.
- Η επέμβαση πρέπει να καθοριστεί ανάλογα με την ημερομηνία συγκομιδής της κάθε ποικιλίας.
- Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης με βάση τις πτήσεις και των τριών εντόμων και ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή (αύξουσα ταξινόμηση)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	29-31 Ιουλίου	<i>Bacillus thuringiensis</i> spp. Aizawai (2), <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i>	0
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	25-28 Ιουλίου	Methoxyfenozide (3)	7
		Chlorantraniliprole (2)	14
		Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (1-2)	14
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	29-31 Ιουλίου	Beta-cyfluthrin (2)	7
		Deltamethrin (1-2)	7
		Emamectin (3)	7
		Etofenprox (2)	7
		Lambda cyhalothrin (2)	7
		Spinosad (3)	7
		Indoxacarb (3)	10
		Phosmet (2)	14
Chlorpyrifos-methyl (1)	21		

- Από δειγματοληψίες καρπών σε αρκετές περιοχές των νομών Ημαθίας και Πέλλας διαπιστώθηκε προνυμφική δραστηριότητα ανάρσιας και κυρίως βλαστορύκτη της ροδακινιάς.



Τα συμπτώματα ζημιάς από τα δύο έντομα μοιάζουν πολύ.

Οι προνύμφες αυτήν την εποχή ορύσσουν στοές στο εσωτερικό των καρπών που πλησιάζουν την ωρίμανση.



ανάρσια, σοκολατένιο σκουλήκι



βλαστορύκτης της ροδακινιάς, ρόδινο σκουλήκι

Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος

Ευστράτιος Δαδάκης