

ΕΛΙΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(Μυκητοκτόνα)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)			
	Γλοισπόριο	Καρκίνωση	Κυκλοκόνιο	
Calcium copper sulfate	✓	✓	✓	21
Copper hydroxide	✓	✓	✓	21
Copper oxchloride	✓	✓	✓	21
Copper sulfate, tri-basic	✓	✓	✓	21
Difenoconazole			✓	30
Dodine	✓		✓	15
Copper oxide			✓	21
Kresoxym methyl			✓	Ελαιοποιήσιμες 30 Επιτραπέζιες πριν την άνθηση
Trifloxystrobin			✓	14 (2εφαρμογές / 1μόνο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου)
Trifloxystrobin + tebuconazole			✓	Προληπτική εφαρμογή από την έναρξη της βλάστησης μέχρι πριν την άνθηση. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 12-14 ημέρες.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.)
Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Καβάλα 19/03/2015