

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ - ΚΑΡΥΔΙΑ (ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)



Καρπόκαψα. Προσβολή νεαρού καρπού.



Φουζικλάδι. Προσβολή καρπιδίου.



Ωίδιο. Προσβολή σε νεαρή βλάστηση.

Πληροφορίες: Νικόλαος Ι. Μπαγκής - Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός

3.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : (<i>Carpocapsa pomonella</i>) Μηλιά - Αχλαδιά - Καρυδιά	Στο δίκτυο παγίδευσης, το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται σημαντική αύξηση των συλλήψεων και των ωστοκίων του εντόμου. Συνιστάται επανάληψη ψεκασμού το διάστημα: <ul style="list-style-type: none">• Στις ημιορεινές - μεσοπρώιμες περιοχές : 3 - 4 Ιουνίου.• Στις ορεινές - όψιμες περιοχές (Δαμάστα, οροπέδιο Λασιθίου, οροπέδιο Κρουσώνα, κ.α.) : 4 - 5 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι στην γενιά αυτή, εκτός από τους καρπούς, θα πρέπει να γίνεται καλή διαβροχή και στο φύλλωμα.
ΣΕΖΙΑ : (<i>Sesia myoriformis</i>) (Μηλιά)	Αυξημένη συνεχίζει στο δίκτυο παρακολούθησης και η πτήση της σέζιας. Κρίσιμη περίοδος για νέες προσβολές είναι κυρίως μέχρι και τον Ιούλιο. Συνιστάται επαναληπτικός κατευθυνόμενος ψεκασμός κορμού και βραχιόνων με διαβροχή μέχρι απορροής με ένα εγκεκριμένο σκεύασμα. Συνδυασμός με θερινό πολτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.
ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : (<i>Fusicladium dendriticum</i>) (<i>Fusicladium pyrinum</i>)	Οι δροσιές που επικρατούν κατά διαστήματα συντηρούν την ασθένεια και δίνουν νέες προσβολές μόνο κοντά στις θέσεις που έχει εκδηλωθεί. Αχλαδιές και μηλιές με συμπτώματα θα πρέπει να καλύπτονται σε περιόδους με δροσιές ή πιθανές βροχές.

ΩΙΔΙΟ (Μηλιά) : <i>(Oidium farinosum)</i>	Οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια και οι νεαροί καρποί είναι ευπαθείς. Στις μηλιές συνιστάται συνδυασμένη επέμβαση με την καρπόκαψα.
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : <i>(Erwinia amylovora)</i> (Αχλαδιά)	Μικρή εμφάνιση και εξέλιξη της ασθένειας τη φετινή περίοδο. Όπου εντοπίζονται ύποπτα τμήματα , να αφαιρούνται με ξηρό καιρό , μαζί με υγιές τμήμα και να καταστρέφονται άμεσα. Υπενθυμίζεται ότι τα εργαλεία πρέπει να απολυμαίνονται συνεχώς κατά τις εργασίες αφαίρεσης με οινόπνευμα του εμπορίου.

ΦΑΡΜΑΚΑ: Να επιλέγονται σύμφωνα με τις λίστες δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει. Διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Η σωστή εφαρμογή αυξάνει την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και προστατεύει τον χρήστη, το περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Ηράκλειο 30 Μαΐου 2014
 Ο Προϊστάμενος Δ/σης
 Τρουλλάκης Ιωάννης