



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου


8 / 18-02-14

### Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

#### Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς



Γ  
Ροζ κορυφή



Δ  
Λευκή κορυφή



Ε  
Οι στήμονες  
διακρίνονται



Ζ  
Άνθη ανοιχτά



Η  
Πτώση των πετάλων

#### 1. ΚΟΡΥΝΕΟ

Η ασθένεια προσβάλλει όλα τα πυρηνόκαρπα. Στη βερικοκιά πιο σημαντική είναι η προσβολή των οφθαλμών, των φύλλων και των καρπών.

**Διαπιστώσεις:** Οι θερμοκρασίες και οι υγρασίες ευνοούν την ασθένεια.

**Συμπτώματα:** Ο μύκητας προκαλεί αρχικά κόκκινες κηλίδες στα φύλλα, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται καστανές και ξηραίνονται στο κέντρο. Οι νεκροί ιστοί πέφτουν, οπότε σχηματίζονται οπές, «τρύπες από σκάγια». Παρόμοιες κηλίδες (συχνά βυθισμένες) εμφανίζονται στους καρπούς, οι οποίες και εξελίσσονται σε καστανά δερματώδη λέπια.

Πολλές φορές πάνω στις κηλίδες εμφανίζεται έκκριση κόμεος.

**Οδηγίες:** Να γίνει προληπτική επέμβαση στην πτώση των πετάλων.

**Φυτ/τικά  
προϊόντα:** *Θιράμ, Κάπταν, Ντιθιανόν.*

#### 2. ΜΟΝΙΛΙΑ

**Διαπιστώσεις:** Οι υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από τον μύκητα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα για την μονιλία.

**Φυτ/κά  
προϊόντα:** **Βλέπε δελτίο 5/ 4-2-14.**



## **Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ**

### **1.ΜΟΝΙΛΙΑ - ΕΞΩΑΣΚΟΣ**

**Οδηγίες-**

**Φυτ/κά**

**Βλέπε δελτίο 5/ 4-2-14.**

**προϊόντα:**

### **2.ΩΙΔΙΟ**

Ο μύκητας προσβάλλει φύλλα βλαστούς και καρπούς στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους. Η ασθένεια είναι πιο συχνή σε πυκνούς σπωρώνες ευπαθών ποικιλιών και σε φυτώρια. **Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος της πτώσης των πετάλων μέχρι να αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα, είναι καθοριστικό για την ασθένεια.**

**Διαπιστώσεις:**

**Οι υπερπρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στην ασθένεια. Οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τον μύκητα. Να μην γίνει επέμβαση. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.**

**Οδηγίες:**

## **Γ. ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΥΣΣΙΝΙΑ**

### **ΜΟΝΙΛΙΑ - ΚΟΡΥΝΕΟ**

**Οδηγίες:**

**Σε κτήματα που δεν έγινε φθινοπωρινή επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα, συνιστάται ψεκασμός μέχρι το στάδιο Γ (χρήση εγκεκριμένου για την καλλιέργεια χαλκούχου σκευάσματος) για προστασία από τις παραπάνω ασθένειες.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
*Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)).*

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**