

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)



**Ευδεμίδα.** Προσβολές.



**Ευδεμίδα.** Ράγες προσβεβλημένες  
(διακρίνονται οι χαρακτηριστικές σπές).



**Ωίδιο.** Προσβολή σε ράγες, άξονες και  
μίσχους σταφυλιών.

Πληροφορίες: Ν. Μπαγκής.

22.

<b>ΕΥΔΕΜΙΔΑ:</b> ( <i>Lobesia botrana</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>- Η τρίτη πτήση του εντόμου έχει ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα στις πρώιμες - παραλιακές περιοχές του νομού Χανίων (Ακρωτήρι, Κολυμβάρι, Καστέλι Κισσάμου κλπ.).</li><li>- Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα με σημαντική άνοδο των πληθυσμών στο δίκτυο παγίδευσης.</li><li>- Οι προσβολές αυτής της γενιάς συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια (όξινη σήψη, βοτρυτής) και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.</li></ul>
Πρώιμες περιοχές (ν.Χανίων)	⇒ Συνιστάται αντιμετώπιση το διάστημα 13 - 15 Ιουλίου. Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.
<b>ΩΙΔΙΟ:</b> ( <i>Erysiphe necator</i> ) (Σίρικας, χολέρα) Συστάσεις:	<p>Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών (λίκια) όλη τη βλαστική περίοδο και οι προσβολές τους υποβαθμίζουν τα σταφύλια για επιτραπέζια χρήση.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Στα επιτραπέζια σταφύλια να συνεχιστεί η συστηματική αντιμετώπιση.</li><li>- Στα υπόλοιπα αμπέλια που βρίσκονται πριν από το γυάλισμα μπορούν να γίνουν συνδυασμένες επεμβάσεις με την ευδεμίδα.</li></ul>
<b>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:</b> ( <i>Empoasca spp</i> )	Όπου εντοπίζονται πληθυσμοί με την επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος μπορεί να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δίνεται προσοχή στην καλή διαβροχή της ακραίας τρυφερής βλάστησης.

Τα Τεχνικά Δελτία για την Π. Ε. Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων.

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει.

*Ηράκλειο 12 Ιουλίου 2016*

*Η Προϊσταμένη Τμήματος*

*Κληρονόμος Ευφροσύνη*