



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**

**ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

15/7-4-15

**Α.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ**

**1.ΩΙΔΙΟ**

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος της πτώσης των πετάλων μέχρι να αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα, είναι καθοριστικό για την ασθένεια.

**Διαπιστώσεις:** Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.

**Οδηγίες:** **Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου στις ποικιλίες που βρίσκονται σε στάδιο προσβολής. Την κρίσιμη περίοδο τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα.** Στα νεκταρίνια και στις ευπαθείς ποικιλίες ροδακινιάς, θα χρειαστεί επαναληπτική επέμβαση, ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί.

**Φυτ/κά προϊόντα:** {Θείον, Μπουπιριμέιτ μόνο σε ροδακινιά}, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Πενκοναζόλ, Μυκλομπουτανίλ, Ντιφενοκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ, Φλουοπιυράμ + Τεμπουκοναζόλ, Τριφλοξυστρομπίν, Τριφλοξυστρομπίν+Τεμπουκοναζόλ, Φενμπουκοναζόλ.

**Β. ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΥΣΣΙΝΙΑ**

**1. ΜΟΝΙΛΙΑ**

**Βλαστικά Στάδια Κερασιάς**

|   |  |   |                          |                           |
|---|--|---|--------------------------|---------------------------|
|   |  |   |                          |                           |
| <b>Γ</b><br>Εμφάνιση<br>ανθοφόρων<br>οφθαλμών | <b>Δ</b><br>Οι ανθοφόροι<br>οφθαλμοί<br>ξεχωρίζουν | <b>Ε</b><br>Διακρίνονται οι<br>στήμονες | <b>Ζ</b><br>Άνθη ανοιχτά | <b>Η</b><br>Πτώση πετάλων |
| <b>BVCH SCALE</b><br>53                       | 57   | 59                                      | 65                       | 69                        |

**Οδηγίες:** Τα δέντρα πρέπει να είναι προστατευμένα από την μονιλία, καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης.

**Φυτ/κά προϊόντα:** Θιράμ, Θιοφανείτ-μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν, Ντιφενοκοναζόλ, Προχλοράζ, Συπροντινίλ, ►

*Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Τεμπουκοναζόλ+ Τριφλοσουτρομπίν, Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ, Φενχεξαμίντ, {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.*

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & α.α**

**Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**