



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Πληροφορίες: *N. Πέττας Γεωπόνος MBA, MSC*

Δελτίο
Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Φυτοπροστασίας

ΜΗΛΟΕΙΔΗ
Ν° 4 / 29-04-2015

Για τις περιοχές:
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ.


ΑΧΛΑΔΙΑ: Πεδινές περιοχές



Αρχή φουσκώματος



Πράσινη κορυφή



Λευκή κορυφή



Έναρξη άνθησης



Καρπίδιο

Βλαστικά στάδια: Αχλαδιά: Πεδινές περιοχές: Καρπίδιο.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Η α' πτήση του εντόμου ξεκίνησε το γ' 10ήμερο του Απριλίου και οι συλλήψεις είναι μέτριες.

Συστάσεις: Να γίνει άμεσα εφαρμογή εντομοκτόνων με ωοκτόνο δράση. Εφαρμογή εντομοκτόνων με προνυμφοκτόνο δράση ή σκευασμάτων που περιέχουν το *Bacillus thuringiensis* το διάστημα 4- 8 Μαΐου. Η προσθήκη θερινού λαδιού βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει στην καταστολή της ψύλλας και των ακάρεων. Η επανάληψη του ψεκασμού εξαρτάται από την υπολειμματική διάρκεια του εντομοκτόνου και την ένταση της προσβολής. Για να προστατευθούν τα ωφέλιμα, τα πυρεθροειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο στον πρώτο ψεκασμό.

ΨΥΛΛΑ

Διαπιστώσεις: Μέχρι στιγμής οι προσβολές είναι περιορισμένες. Στις δειγματοληψίες παρατηρούνται ακμαία, αυγά, προνύμφες α', β' σταδίου και λίγα μελιτώματα στη βλάστηση.

Συστάσεις: Στις αχλαδιές που διαπιστώνονται μελιτώματα να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙ – ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Διαπιστώσεις: Αραιές προσβολές από τις δύο ασθένειες παρατηρούνται σε αφέκαστα δενδροκομεία.

Το θεωρητικό ποσοστό των εκτοξευόμενων ασκοσπορίων του Φουζικλαδίου πλησιάζει το μέγιστο στις πεδινές περιοχές και υπάρχει ακόμη κίνδυνος για πρωτογενείς μολύνσεις, εφόσον σημειωθούν βροχοπτώσεις.

Συστάσεις: Να συνεχιστεί η προστασία για το Φουζικλάδι, κυρίως στα δενδροκομεία που διαπιστώνονται κηλίδες, επειδή με τις υγρασίες που επικρατούν υπάρχει κίνδυνος δευτερογενών μολύνσεων. Επίσης να συνεχιστεί η προστασία για το Βακτηριακό κάψιμο.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Συστάσεις: Ψεκασμός στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται 2 – 3 κινητές μορφές ανά φύλλο.

Φάρμακα: Στις λίστες των φυτοπροστατευτικών. Ακολουθείται πιστά τις οδηγίες της ετικέτας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC

Όλα τα δελτία αναρτώνται στον ηλεκτρονικό κόμβο του Υπουργείου www.minagric.gr
Παραλαβή των δελτίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με απλό αίτημα στο pkpfpatr@otenet.gr