



Φύλλα προσβεβλημένα από κυκλοκόνιο

Ταχ. Δίψη:

Αγ. Λουκάς
Τέρμα Αμυνταίου
65110 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ. : 2510600421
Fax: 2510600430

Πληροφορίες : Κ. Λίλης -Δ. Πυργιώτη
Γ. Βενέτη- Μ. Ηλιάδου
Τηλ: 2510 600421-422-425-420

Αρ. Δελτίου: 12/03-10-2014

ΕΛΙΑ

Ι.ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ

Ασθένεια που προσβάλλει τα φύλλα, τους κλαδίσκους και τις ανθοταξίες των ελαιόδένδρων, κυρίως όμως προκαλεί ζημιές στα φύλλα. Με την προσβολή των φύλλων παρατηρείται φυλλόπτωση, εξασθένηση των δένδρων και σε έντονες προσβολές έχουμε μερική ή ολική ακαρπία.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Στα φύλλα εμφανίζονται μερικές κυκλικές κηλίδες σταχτόχρωμου χρώματος με χρυσοκίτρινο κύκλο γύρω τους, διαμέτρου 0,5-1 εκ. Ιδανικές συνθήκες για την ασθένεια είναι οι βροχοπτώσεις, η υψηλή υγρασία και θερμοκρασίες από 10 έως 22°C, συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνει άμεσα ένας ψεκασμός για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Θα πρέπει να γίνει καλό λούσιμο των δένδρων. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε ελαιοκτήματα υγρών περιοχών και όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο. Να γίνει ένας επαναληπτικός ψεκασμός μετά από **25-30 ημέρες** απαραίτητος για τις υγρές περιοχές.

Ενδεικτική τιμή ψεκαστικού υγρού κατά στρέμμα είναι 150-200 λίτρα για ελαιόδενδρα ηλικίας 10 χρονών και πάνω.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

1. Βορδιγάλειος πολτός (διάφορα σκευάσματα)
2. Οξυχλωριούχος χαλκός (διάφορα σκευάσματα)
3. Υδροξείδιο του χαλκού (διάφορα σκευάσματα)

και άλλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση του κυκλοκονίου.

Η υπολειμματική διάρκεια των χαλκούχων σκευασμάτων για την ελιά είναι 21 ημέρες. Να προτιμούμε όμως η συλλογή να γίνεται σε περισσότερες ημέρες από τον τελευταίο ψεκασμό.



Συστήχρησι
φυτοφαρμακικών
σημαίνει
●
καλύτερη
φυτοπροστασία
●
οικονομία
●
προστασία
της φύσης
και του
καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ
Στους αγρότες
που το ζητούν

II. ΚΑΠΝΙΑ

Είναι το μαύρισμα που παρατηρείται στα φύλλα και στους βλαστούς των ελαιοδένδρων . Δημιουργείται από μύκητες που αναπτύσσονται στα μελιτώματα των κοκκοειδών. Αντιμετωπίζεται με χαλκούχα σκευάσματα ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση του κυκλοκονίου. Καλύτερη αντιμετώπιση επιτυγχάνεται με την καταπολέμηση των κοκκοειδών την κατάλληλη εποχή.

III. ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ

Η ασθένεια προέρχεται από την είσοδο του βακτηρίου ψευδομονάς στις πληγές και σχισμές του φλοιού των κλάδων της ελιάς. Ιδανικές συνθήκες για την είσοδο του βακτηρίου υπάρχουν μετά το κλάδεμα, χαλάζι, παγετό, συγκομιδή. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της καρκίνωσης είναι οι όγκοι που δημιουργούνται στους βραχίονες και βλαστούς των ελαιοδένδρων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδίσκων και κλάδων και όταν αυτό δε μπορεί να γίνει σε μεγάλους βραχίονες συνιστάται να γίνεται αφαίρεση των όγκων και απολύμανση των πληγών. Προληπτικά για να μη δημιουργηθούν όγκοι θα πρέπει να γίνεται πάντα ένας ψεκασμός με ένα χαλκούχο σκεύασμα μετά από χαλάζι, παγετό, κλάδεμα και συλλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η
Προϊσταμένη Δ/σης

Αδαμίδου Ζωή