



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

**46 / 1-9-16**

## ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

### **1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ**

**Διαπιστώσεις:** Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών των δύο κοκκοειδών.

**Οδηγίες:** **Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:**

**α) Πρώιμες περιοχές: Από 1 έως 4 Σεπτέμβρη.**

**β) Όψιμες περιοχές: Από 5 ως 9 Σεπτέμβρη.**

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

*Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.* Ο θερινός πολτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτος, ή σε συνδυασμό με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Αυτήν την εποχή λόγω συνύπαρξης όλων των βιολογικών σταδίων των κοκκοειδών προτείνεται ο συνδυασμός.

Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

### **2.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ**

**Διαπιστώσεις:** Οι εκκολάψεις είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν προσβολές και σε κάποιους οπωρώνες σοβαρές.

**Οδηγίες:** **Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει καταπολέμηση από 1 ως 4 Σεπτέμβρη άσχετα με την πρωιμότητα της περιοχής.**

**Ο ψεκασμός πρέπει να είναι επιμελημένος, με έμφαση στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων.**

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

*Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.*

### **3. ΙΣΕΡΥΑ Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ**

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει έλεγχος για την παρουσία του ωφέλιμου αρπακτικού, το οποίο εφόσον υπάρχει, θα ελέγξει τους πληθυσμούς της Ισέρυας. Όπου απαιτείται επέμβαση, αυτή να πραγματοποιηθεί στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα.

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**Ισέρυα:** *Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.*

### **4.ΚΟΚΚΟΣ (Coccus hesperidum)**

**Διαπιστώσεις:** Οι εκκολάψεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι προσβολές έχουν μειωθεί σημαντικά.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα. ►

Απαιτείται προσοχή επειδή οι νύμφες του *Pulvinaria Floccifera* δύσκολα διακρίνονται από τον κόκκο και η όποια επέμβαση αυτήν την εποχή είναι χωρίς αποτέλεσμα.

*Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ.*

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

## **5. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ**

**Οδηγίες:** Ο κίνδυνος προσβολών είναι μεγάλος. Να συνεχιστεί η προστασία σε ασυγκόμιστες όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών.

**Φυτ/κά  
προϊόντα:** Βλέπε δελτίο 22 /5-5-16.

## **6. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ**

**Διαπιστώσεις:** Υπάρχουν σοβαρές προσβολές σε αρκετούς οπωρώνες και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τους τετρανύχους.

**Οδηγίες:** Ελέγχετε συστηματικά τους οπωρώνες. Επέμβαση χρειάζεται σε οπωρώνες που διαπιστώνετε κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων ή 3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης.

**Φυτ/κά  
προϊόντα:** Άλατα λιπαρών οξέων, Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Εξιθιαζόξ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν (σε πορτοκαλιά και Μανταρινιά), Μπιφεναζείτ, Σπιροντικλοφέν, Τεμπουφενπυράντ, Φενπιροξιμέιτ, Θερινά λάδια.

## **7. ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (*Aculops pelecassi*) & ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ (*Aceria Sheldoni*)**

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει καταπολέμηση.

**Φυτ/κά** Θερινός πολτός, Αμπαμεκτίν (για το παραμορφωτικό άκαρι).

**προϊόντα:**

## **8. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ**

**Διαπιστώσεις:** Το έντομο βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα. Τα νεαρά δένδρα,

**Οδηγίες:** φυτώρια και εμβόλια πρέπει να είναι προστατευμένα με επανάληψη των επεμβάσεων ανάλογα με το ΦΠ που χρησιμοποιείτε.

Δελτίο 31/8-6-16 .

## **9. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ**

**Οδηγίες:** Ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στο 31/8-6-16 δελτίο. Σε περιπτώσεις που έχετε προσβολή, μπορείτε να στέλνετε δείγματα στην υπηρεσία μας για τον έλεγχο του παρασιτισμού.

## **10. ΑΦΙΔΕΣ**

**Οδηγίες:** Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αφίδες είναι φορείς ιώσεων (Τριστέτσα). Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση.

**Φυτ/κά  
προϊόντα:** Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ, Λάμντα συαλοθρίν, Ντιμεθοείτ, Πιριμικάρμη, Πυρεθρίν, { Πυμετροζίν μόνο στην πορτοκαλιά }, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Σας θυμίζουμε ότι η επέμβαση της Άνοιξης (πριν το κλείσιμο του κάλυκα), είναι η καθοριστική για τον ψευδόκοκκο.
2. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**