




ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

34/28-6-16

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η πρώτη πτήση του εντόμου και στις ορεινές περιοχές.

**Οδηγίες-
Φυτ/κά
προϊόντα:**

Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέχρι 2 Ιουλίου με: Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8, Αμπαμεκτίν+Χλωραντраниλιπρόλ, Μεθοξυφenoζάιντ, Ντιφλουμπενζουρόν, Χλωραντраниλιπρόλ.

2. Από 3 ως 7 Ιουλίου με:

Δελταμεθρίν, (Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Στις κυδωνιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Μέχρι 2 Ιουλίου με: Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2. Από 3 ως 7 Ιουλίου με:

Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

2. ΝΑΡΚΗ - ΣΕΣΙΑ

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Νάρκη: Αμπαμεκτίν+Χλωραντраниλιπρόλ, Θιακλοπρίντ, Μεθοξυφenoζάιντ, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινοσάντ, Τ-φλουβαλινείτ, Φenoξικάρμπ, Φοσμέτ, Χλωραντраниλιπρόλ.

Σέσια: Μπέτα συφλουθρίν.

3. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Οδηγίες:

Ελέγχετε τους οπωρώνες. Από 20 συγκεκριμένα δένδρα συλλέγετε 5 φύλλα και εφόσον βρείτε πάνω από 10 ακάρεα / φύλλο τότε χρειάζεται επέμβαση.

**Φυτ/κά
Προϊόντα:**

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αμπαμεκτίν(2), Αμπαμεκτίν+Χλωραντраниλιπρόλ(1-2), Ασεκουινασίλ(1), Ετοξαζόλ(1), Μιλμπεμεκτίν (2), Μπιφenaζείτ (1) Σπιροντικλοφέν (1) Τεμπουφενπυράντ(1).



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο αριθμός δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας μην υπερβαίνετε τις δοσολογίες και τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών. Η συχνή χρήση πυρεθρινών για την καταπολέμηση άλλων εχθρών εντείνει τις προσβολές (αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων).

4. ΧΑΛΑΖΙ - ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες:

Στους οπωρώνες των περιοχών με χαλαζόπτωση (Αρκαδία) να γίνει άμεσα επέμβαση. Σε οπωρώνες που υπάρχουν και προσβολές από φουζικλάδιο, να χρησιμοποιηθεί μυκητοκτόνο με θεραπευτική και προληπτική δράση. Στους υπόλοιπους οπωρώνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μυκητοκτόνο με προληπτική δράση για την κάλυψη των πηγών που δημιουργήσε το χαλάζι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Με βάση τον Καν (ΕΕ)2016/60 έγινε τροποποίηση της έγκρισης των ΦΠ με δραστική ουσία το χλωρπυριφός. Σε αχλαδιές και μηλιές απαγορεύεται η χρήση του μετά την άνθηση.
- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ