



Θεσσαλονίκη 25 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 9631

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ:

Ταχ. Διεύθυνση ☒ : Αλ. Παπαναστασίου 63
544 53 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες ✉ : Α. ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
Τηλέφωνο ☎ : 2310-984185, 984189
Telefax : 2310-914303
e-mail : u12805@minagric.gr
u12846@minagric.gr

Όπως Π.Δ.

**1^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Μ.Ε.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

1. Στόχοι

- 1.1 Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβakoπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
- 1.2 Αφορά το διάστημα της καρποφορίας και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβakoφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
- 1.3 Ο βαμβakoπαραγωγός απαιτείται να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβakoχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

2. Διαπιστώσεις

- 2.1 Η συνολική εικόνα είναι ότι οι βαμβakoφυτείες βρίσκονται λίγο πριν το τέταρτο στάδιο ανάπτυξης «Καρποφορία με καρπόδεση του 50 % των ανθέων».
- 2.2 Συλλήψεις ενηλίκων, τόσο του πράσινου όσο και του ρόδιου σκουληκιού, υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης στις οποίες εγκαταστάθηκαν φερομονικές παγίδες. Από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους για προνύμφες δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πάνω από το όριο επέμβασης.
- 2.3 Από τα έντομα που προσβάλλουν το βαμβάκι διαπιστώθηκαν μικροί πληθυσμοί από αφίδες και λύγκο.

3. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές

- 3.1 Συνιστάται στους βαμβakoπαραγωγούς να παρακολουθούν τις καλλιέργειες τους επισταμένως κάθε 3-4 ημέρες, για τη διαπίστωση
 - i. ύπαρξης ή όχι προνυμφών της 1^{ης} γενεάς του πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι (μέχρι 30/7, πέραν της ημερομηνίας αυτής αναμένεται η 2^η γενεά),
 - ii. προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) για το ρόδιο σκουλήκι
- 3.2 Οι βαμβakoπαραγωγοί πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία τρυφερών, χυμωδών βλαστικών ιστών οι οποίοι προσελκύουν τα έντομα όπως ορθολογική άρδευση και χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης.

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

Για το **πράσινο σκουλήκι** συνιστάται εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΜΟΝΟ στην περίπτωση που οι παραγωγοί εντοπίσουν 6-8 προνύμφες κ.μ.ο. ανά 100 φυτά.

Την περίοδο αυτή προτιμώνται από τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα εκείνα τα οποία με τον τρόπο και το φάσμα δράσης τους κατά την εφαρμογή στην βαμβακοκαλλιέργεια, είναι φιλικά προς τα ωφέλιμα έντομα.

Για το **ρόδινο σκουλήκι** κατώτατο όριο επέμβασης, για εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, είναι η εύρεση 20 προσβεβλημένων ανθέων (ροζέτες) σε δείγμα 100 ανθέων από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας.

Προσοχή:

- Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και για τους δύο εχθρούς αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ.
- Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
- Για την προστασία των μελισσών οι ψεκασμοί πρέπει να διενεργούνται τη νύχτα.

**Μ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α.**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτ. Παραγωγής
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Προστασίας Φυτών
Λ. Συγγρού 150, 17671 Καλλιθέα

Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης
Θέρμη Τ.Κ. 57001 Θεσ/νίκη Τ.Θ. 436

Καταστήματα λιανικής ή/και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (έδρες τους)

Δήμοι Π.Ε. Θεσσαλονίκης (έδρες τους)

