



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

42/27-7-15

1. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ(ΑΧΛΑΔΙΑ)

Διαπιστώσεις: Οι πληθυσμοί είναι υψηλοί και ο κίνδυνος προσβολών μεγάλος για τα αχλάδια όλων των περιοχών.

Οδηγίες: **Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου στις αχλαδιές όλων των περιοχών. Η προστασία να συνεχιστεί ως την συγκομιδή.**

Φυτοπρ/κά προϊόντα: Παγίδες προσέλκυσης-θανάτωσης με *Δελταμεθρίν* ή ψεκασμός με *Δελταμεθρίν (7 μέρες)*.

ΜΗΛΙΑ - ΚΥΔΩΝΙΑ

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Η πτήση της δεύτερης γενιάς του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη με μέτριους πληθυσμούς.

Οδηγίες: Σε μηλιές και κυδωνιές να γίνει επέμβαση από 1-4 Αυγούστου.

Φυτ/κά προϊόντα: *Μηλιά: Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Ετοφενπρόξ, Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινোসάντ, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.*

Κυδωνιά: *Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωλπυριφός μεθύλ.*

2. ΝΑΡΚΗ – ΣΕΣΙΑ

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

Φυτ/κά προϊόντα: Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

3. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαπιστώσεις: Τα τελευταία χρόνια δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στις ποικιλίες Τζόναγκολντ & Γκόλντεν. Οι πληθυσμοί είναι υψηλοί λόγω της πληθώρας των φρούτων που υπάρχουν αυτήν την εποχή.

Οδηγίες: **Άμεση έναρξη επεμβάσεων στις δύο αυτές ποικιλίες και σε οπωρώνες που υπάρχει δεδομένο προσβολών τα προηγούμενα χρόνια. Η προστασία να συνεχιστεί ως την συγκομιδή.**

Φυτοπρ/κά προϊόντα: Παγίδες προσέλκυσης-θανάτωσης με *Δελταμεθρίν* ή ψεκασμός με *Δελταμεθρίν (7 μέρες)*. ▶

4. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που διαπιστώνετε ενεργές κηλίδες του μύκητα, να συνεχιστεί η προστασία.

5. ΠΙΚΡΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ

Είναι μη παρασιτική ασθένεια που οφείλεται σε ανεπαρκή εφοδιασμό των καρπών με ασβέστιο. Η έλλειψη ασβεστίου στους καρπούς προέρχεται από τον ανταγωνισμό κυρίως αζώτου, καλίου, μαγνησίου. Η «ασθένεια» είναι σοβαρότερη σε καρπούς νεαρών δένδρων με μικρή καρποφορία και σε μεγάλου μεγέθους καρπούς.

Οδηγίες: Όπου υπάρχει δεδομένο εμφάνιση της «ασθένειας» από την προηγούμενη χρονιά, να γίνει ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα ασβεστίου με προσθήκη διαβρεκτικού.

Να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων και ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 15 ημέρες.

Προσοχή στις οδηγίες χρήσης των σκευασμάτων για την αποφυγή δημιουργίας εγκαυμάτων στους καρπούς.

Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών αυξάνεται, αν συγχρόνως αποφεύγονται συνθήκες που αυξάνουν την ευπάθεια των καρπών, όπως, ακανόνιστα ποτίσματα, απότομη έκπτυξη ζωηρής βλάστησης, πλούσια αζωτούχος και καλιούχος λίπανση και συγκομιδή καρπών σε πολύ πρόωρο στάδιο ωρίμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1. ΠΡΟΣΟΧΗ στην υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις αχλαδιές.**
- 2. Στα μυκητοκτόνα για το φουζικλάδιο να γίνεται εναλλαγή των ομάδων των δραστικών ουσιών για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.**
3. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & α.α

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ