



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

34/23-6-15

ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ (ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Η δεύτερη πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

**Οδηγίες
Φυτ/κά
προϊόντα:**

**Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών μπορείτε να επέμβετε
επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:**

1.Άμεσα με: *Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ (14 ημ.), Φενοξυκάρμπ (30 ημ.), Χλοραντρανιλιπρόλ (14 ημ.).*

2. Μέχρι 26 Ιουνίου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Μεθοξυφenoζάντ (14 ημ.), Ντιφλουμπενζουρόν (30 ημ.).*

3.Από 27 ως 30 Ιουνίου με:

Δελταμεθρίν (7 ημ.), Θιακλοπρίντ (14 ημ.), Ιντοξακάρμπ (10 ημ.), Λάμντα Συαλοθρίν (7 ημ.), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.), Σπινοςάντ (14 ημ.), Φοσμέτ(28 ημ.), Χλωρπυριφός (30 ημ.), Χλωλπυριφός μεθύλ (21 ημ.).

Στις κυδωνιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Μέχρι 26 Ιουνίου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2.Από 27 ως 30 Ιουνίου με:

Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωλπυριφός μεθύλ.

**Στις αχλαδιές και μηλιές των ορεινών περιοχών να μην γίνει
επέμβαση για την καρπόκαψα. Αναμένεται η έναρξη της πτήσης.
Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.**

2.ΨΥΛΛΑ

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν σοβαρές προσβολές σε αρκετούς οπωρώνες και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξέλιξη του εντόμου.

**Οδηγίες:
Φυτ/κά
προϊόντα:
ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. Βλέπε δελτίο 19/30-4-15.

Για την σωστή αντιμετώπιση του εντόμου να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών και να τηρείται αυστηρά ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, για κάθε δραστική ουσία.



3. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (ΜΗΛΙΑ -ΑΧΛΑΔΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις , θερμοκρασία) ευνοούν τον μύκητα και η εξέλιξή του είναι ταχύτατη.

Οδηγίες: **Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου. Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με προστατευτική και θεραπευτική δράση.**

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**
1. Μην υπερβαίνετε τον αριθμό των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, που αναγράφεται στην ετικέτα του κάθε σκευάσματος. Με την συνεχή χρήση ενός φυτοπροστατευτικού, αυξάνεται η πιθανότητα να δημιουργηθούν πληθυσμοί με ανθεκτικότητα στην δραστική ουσία του εν λόγω φυτοπροστατευτικού και να είναι πλέον αναποτελεσματικό.
 2. **Προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί σε πρώιμες ποικιλίες.** Οι μέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση ως την συγκομιδή.
 3. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ