



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

**31/8-6-16**

## ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

### 1. ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΗΣ (Φυλλοκνίστης)

**Διαπιστώσεις:** Ξεκίνησε η δραστηριότητα του εντόμου στις πρώιμες περιοχές.

**Οδηγίες:** **Α. Δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία:**

**Καλλιεργητικά μέτρα:**

- α) αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων.
- β) αφαίρεση και καταστροφή των λαιμαργών βλαστών.
- γ) περιορισμός των αρδεύσεων στις απολύτως αναγκαίες.

**Χημικές επεμβάσεις δεν χρειάζονται.**

**Β. Τα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια πρέπει να προστατευτούν:**

Εφόσον διαπιστώσετε έναρξη της δραστηριότητας του εντόμου ( ύπαρξη στοών ), να ξεκινήσετε επεμβάσεις επαναλαμβανόμενες ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιήσετε.

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**1. Πορτοκαλιά:** Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφenoζάντ, Μιλμπεμεκτίν* { *Χλοραντρανιλιπρόλ* - **μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία** },

**2. Μανταρινιά:** Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφenoζάντ, Μιλμπεμεκτίν, Τεμπουφenoζάντ*, { *Χλοραντρανιλιπρόλ* - **μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία** }.

**3. Λεμονιά:** Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ*, { *Χλοραντρανιλιπρόλ* - **μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία** }.

**4. Φυτώρια πορτοκαλιάς, μανταρινιάς, λεμονιάς :** *Ασεταμιπρίντ*  
Το *Θιαμεθοξάμ* μπορεί να εφαρμοστεί και με ριζοπότισμα σε νέα μη παραγωγικά δένδρα (1 γραμ ανά δένδρο).

## 2. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

**Οδηγίες:** Να συνεχιστούν οι ψεκασμοί στα όψιμα πορτοκάλια και μανταρινιά που δεν έχουν συγκομισθεί.

**Φυτ/κά προϊόντα:** Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

## 3. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

**Οδηγίες:** Δεν συνιστάται καμία χημική επέμβαση.

Ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη. ►

#### **4.ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ**

**Διαπιστώσεις:** Υπάρχουν προσβολές και από κόκκινο και κίτρινο τετράνυχο, με συνύπαρξη όλων των βιολογικών σταδίων.

**Οδηγίες:** **Ελέγχετε τους οπωρώνες. Επέμβαση χρειάζεται σε οπωρώνες που διαπιστώνετε κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων ή 3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης.**

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Άλατα λιπαρών οξέων, Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Εξιθιαζόξ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν (σε πορτοκαλιά και Μανταρινιά), Μπιφεναζέιτ, Σπιροντικλοφέν, Τεμπουφενπυράντ, Φενπιροξιμέιτ, Θερινά λάδια.*

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  2. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

Η ΠΡΟΣΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ