



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Πανεπιστημίου 334, 264 43 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629, Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

Πληροφορίες:
Πέττας Ν, Γεωπόνος MBA, MSC

Δελτίο
Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Φυτοπροστασίας

ΜΗΛΟΕΙΔΗ
Ν° 3 / 04-07-2016

Για τις περιοχές:
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ (Ορεινές περιοχές)

Ξεκίνησε η 2^η πτήση του εντόμου περίπου την 01 Ιουλίου.

Η έναρξη των εκκολάψεων αναμένεται στις 12 Ιουλίου. Το 50% και 90% των εκκολάψεων αναμένονται στις 23 Ιουλίου και στις 04 Αυγούστου, αντίστοιχα. Επομένως, το διάστημα από τις 12/07 έως 19/08, είναι το παράθυρο εφαρμογών εντομοκτόνων ενάντια στα ωά και στις προνύμφες της καρπόκαψας, η εμφάνιση των οποίων θα είναι κλιμακωτή σύμφωνα με τις εκκολάψεις.

Συστάσεις:

Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών με στόχο τα αυγά ή/και τις προνύμφες της καρποκάψας ως εξής:

- Η 1^η εφαρμογή να γίνει από 05 έως 10 Ιουλίου, με ρυθμιστές ανάπτυξης ή άλλα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται στην ωοαπόθεση και έχουν προνυμφοκτόνο και ωοκτόνο δράση:

ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΧΛΟΡΑΝΘΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ, ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ, ΙΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΚΙΩΣΕΩΝ, ΧΛΟΡΑΝΘΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ (+ ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ).

- Εναλλακτικά, η 1^η εφαρμογή μπορεί να γίνει από 11 έως 17 Ιουλίου, με οργανοφωσφορικά ή συνθετικά πυρεθρινοειδή ή ρυθμιστές ανάπτυξης και λοιπά νεότερα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται από την έναρξη των εκκολάψεων ενάντια στις προνύμφες:

ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ, ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ (Μηλιά), ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΩΣ, ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΦΟΣΜΕΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, Β ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ, , ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΞ (Μηλιά), ΣΥΛΛΟΘΡΙΝ, ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ, ΘΕΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ, ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ.

Οι επαναλήψεις των εφαρμογών, σε 7, 14 ή 21 ημέρες, εξαρτάται από την υπολειμματική διάρκεια του εντομοκτόνου, την ένταση της τρέχουσας προσβολής

και το ιστορικό του μηλεώνα. Στις περιπτώσεις επανάληψης του ψεκασμού να προτιμηθεί εντομοκτόνο από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας. Προκειμένου να προστατευθούν τα ωφέλιμα, συστήνεται τα πυρεθρινοειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 φορά. Βλέπε επίσης την λίστα με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα & ακαρεοκτόνα, έκδοση 27/04/2015.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει επίσης στην αντιμετώπιση των ακάρεων. Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών όπως φυλλορύκτες, αφίδες η κοκκοειδή καθώς και για τον τετράνυχχο να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ: Ορεινές περιοχές

Συστάσεις:

Παρακολούθηση: Εβδομαδιαία δειγματοληψία 5 φύλλων / δέντρο, από 20 σημασμένα δέντρα.

Όρια – Απόφαση επέμβασης:

1. Εάν καταμετρηθούν < 5 ακάρεα κατά μέσο όρο / φύλλο και καθόλου παρουσία αρπακτικού, επανάληψη δειγματοληψίας μετά μία εβδομάδα. Εάν διαπιστωθεί παρουσία αρπακτικού, επανάληψη δειγματοληψίας μετά δύο εβδομάδες
2. Εάν καταμετρηθούν 5-10 ακάρεα κατά μέσο όρο / φύλλο και < 1 αρπακτικό / 10 ακάρεα, επανάληψη δειγματοληψίας μετά από μία εβδομάδα.
3. Εάν καταμετρηθούν > 10 ακάρεα κατά μέσο όρο / φύλλο και < 1 αρπακτικό / 10 ακάρεα: Ψεκασμός

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΚΠΦ & ΠΕ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC

Όλα τα δελτία αναρτώνται στον ηλεκτρονικό κόμβο του Υπουργείου
www.minagric.gr

Παραλαβή των δελτίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με απλό αίτημα στο
pkpfpatr@otenet.gr