



## No 39 / 16 Ιουνίου 2014

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

## ΠΕΛΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΑΡΣΙΑ - ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ*(Anarsia lineatella* Zeller - *Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

- Ξεκίνησε η 2<sup>η</sup> πτήση του Φυλλοδέτη. Η πτήση της Ανάρσιας συνεχίζεται.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή (αύξουσα ταξινόμηση)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	<b>21-23 Ιουνίου</b> και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2), Bacillus thuringiensis var. Kurstaki	0
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	<b>17-20 Ιουνίου</b> και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Methoxyfenozide (3)	7
		Chlorantraniliprole (2)	14
		Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (1-2)	14
		Diflubenzuron (2)	30
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	<b>21-23 Ιουνίου</b> και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Beta-cyfluthrin (2)	7
		Cyfluthrin (1)	7
		Deltamethrin (2)	7
		Emamectin (3)	7
		Etofenprox (2)	7
		Lambda cyhalothrin (2)	7
		Spinosad (3)	7
		Indoxacarb (3)	10
		Phosmet (2)	14
Chlorpyrifos (2)	20		
Chlorpyrifos-methyl (1)	21		

- Στις ποικιλίες που συγκομίζονται μέχρι 20 Ιουνίου δεν απαιτείται επέμβαση.
- Η επέμβαση καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαφα ροδακινιάς) (*Grapholitha molesta* Busck, Lepidoptera: Tortricidae).
- Προσοχή** να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ****(*Pseudaulacaspis pentagona* Targioni, Homoptera: Diaspididae)**

- Η 1<sup>η</sup> πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Προσβάλλει και την ακτινιδιά.
- Μόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται καταπολέμηση.
- Στις ποικιλίες που συγκομίζονται αυτό το χρονικό διάστημα συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή με αύξουσα ταξινόμηση
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	<b>28-30 Ιουνίου</b> και επανάληψη στις <b>7-9 Ιουλίου</b> και <b>14-16 Ιουλίου</b>	Fatty acid potassium salt (4)	0
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση	<b>22-24 Ιουνίου</b> και επανάληψη στις <b>8-10 Ιουλίου</b>	Fenoxycarb (2)	14
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με προνυμφοκτόνο δράση	<b>28-30 Ιουνίου</b> και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Chlorpyrifos (2)	20
		Chlorpyrifos-methyl (2)	21
		Paraffin oil (4)	21
		Spirotetramat (2)	21

- Οι επεμβάσεις για Φυλλοδέτη και Ανάρσια θα καλύψουν σε μεγάλο βαθμό και την βαμβακάδα, ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό που θα επιλεγεί.
- **Προσοχή** να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη