

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkpfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 30 / 20 Μαΐου 2016

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ- ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ

(*Rhagoletis cerasi* Loew, Diptera: Tephritidae)

- Ξεκίνησε η πτήση του εντόμου.
- Συνιστάται επέμβαση από 23 Μαΐου μόλις ξεκινήσει η αλλαγή χρώματος στον καρπό από πράσινο σε υποκίτρινο.
- Στις ποικιλίες που συγκομίζονται ήδη δεν απαιτείται επέμβαση.

| Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες | μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο | Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| Beauveria bassiana | 5 (κάθε 7 ημέρες) | 0 |
| Deltamethrin | 1 | 7 |
| Thiamethoxam | 2 | 7 |
| Phosmet | 1 | 14 |

ΜΟΝΙΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

(*Monilinia fructicola*, *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*)

- Οι βροχοπτώσεις ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων.
- Προτείνεται η προστασία των καρπών που η συγκομιδή ξεκινάει από 1-10 ημέρες.
- Διευκρινίζεται ότι η προστασία των καρπών πριν την συγκομιδή μειώνει τις μετασυλεκτικές σήψεις.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (αριθμός ημερών έως την συγκομιδή):
 - Fenhexamid (1)
 - Bacillus subtilis strain QST 713, Fluopyram + Tebuconazole (3)
 - Fenbuconazole (5)
 - Boscalid + Pyraclostrobin, Cyprodinil, Cyprodinil + Fludioxonil, Difenoconazole, Tebuconazole + Trifloxystrobin (7)
 - Thiophanate-methyl (14)

Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος

Ευστράτιος Δαδάκης