



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

37/19-6-14

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: Η 2^η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη με αραιές συλλήψεις.

Οδηγίες: **Στους αμπελώνες των όψιμων περιοχών(ορεινές περιοχές) δεν απαιτείται επέμβαση. Στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές να γίνει επέμβαση από 25-28 Ιουνίου.**

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης, Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εσφενβαλερέιτ, Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν-μπενζοείτ, Ιντοξακάρμπι, Λάμδα-Συαλοθρίν, Μπέτα -Συφλουθρίν, Πυρεθρίνες, Σπινοσάντ, Συπερμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός - μεθύλ.

Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να διασπείρεται στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Μια ελαφριά αποφύλλωση είναι χρήσιμη. Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να είναι αμφίπλευρη. Η ταχύτητα των ψεκαστικών μηχανημάτων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού υγρού.

2. ΩΙΔΙΟ -ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις: Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για το ωίδιο. Τα σταφύλια μπορούν να προσβληθούν από τον μύκητα.

Η αστάθεια του καιρού (τοπικές βροχοπτώσεις) μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα από τον περονόσπορο.

Οδηγίες: **Ελέγχετε συστηματικά τους αμπελώνες για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών. Σε περιπτώσεις που εντοπίζετε προσβολές να χρησιμοποιείτε σκεύασμα και με θεραπευτική δράση.**

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βλέπε προηγούμενα δελτία.

3. ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Οδηγίες: **Ο καλός αερισμός των πρέμνων βοηθά στην μείωση της υγρασίας, παράγοντα καθοριστικού για τον μύκητα. ►**

Σε υγρές περιοχές που υπάρχει ιστορικό προσβολών και ευαίσθητες ποικιλίες να γίνει επέμβαση.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Aureobasidium pullulans dsm14940 , {Θιράμ μόνο σε οινοποιήσιμα},
Ιπροντιόν , Μεπανιπυρίμ, Μποσκαλίντ, Πυριμεθανίλ, Συπροντινίλ,
Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ, Φενχεξαμίντ, Φλουαζινάμ , Φλουντιοξονίλ,
Φολπέτ+χαλκός.

**4. ΧΑΛΑΖΙ
Οδηγίες:**

Μετά από χαλαζόπτωση και μέσα στο πρώτο 24ωρο, να επεμβαίνετε με χαλκούχο σκεύασμα. Οι πληγές είναι πύλες εισόδου μυκήτων και βακτηρίων. Προσοχή στις φυτοτοξικότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Οι επεμβάσεις με κάθε δραστική ουσία ανά καλλιεργητική περίοδο, να μην υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του σκευάσματος.
- Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών στο πρόγραμμα των επεμβάσεων για να αποφευχθεί η δημιουργία ανθεκτικότητας.
- Οι παρεμποδιστές βιοσύνθεσης εργοστερόλης, να μην εναλλάσσονται μεταξύ τους και οι επεμβάσεις με αυτούς να μην υπερβαίνουν τις (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Μην αναμιγνύετε περισσότερα από δύο σκευάσματα στο ίδιο ψεκαστικό διάλυμα και μην υπερβαίνετε τις αναγραφόμενες δόσεις.
- Να γίνεται καλή κάλυψη όλων των ευαίσθητων οργάνων του αμπελιού. Οι εφαρμογές να γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες
- Οι άκαιρες και χωρίς λόγο επεμβάσεις, επιβαρύνουν οικονομικά και ζημιώνουν το περιβάλλον.
- **Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ