



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

20 / 30-4-15

Α.ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ – ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ- ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ- ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

1. ΑΝΑΡΣΙΑ

Οι προνύμφη του εντόμου προσβάλλει βλαστούς και καρπούς της βερικοκιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς και δευτερευόντως της δαμασκηνιάς.

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η πρώτη πτήση της ανάρσιας σε όλες τις περιοχές.

Οδηγίες:

Στους οπωρώνες των παραπάνω πυρηνοκάρπων, των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών να γίνει επέμβαση από 11 ως 15 Μάη. Στις όψιμες περιοχές μπορείτε να επέμβετε από 19-23 Μάη.

Φυτ/κά προϊόντα:

Βερικοκιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), {Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοσάντ 7 μέρες } , {Ιντοξακάρμπ 10 μέρες } , {Θιαμεθοξάμ+Χλωραντρανιλιπρόλ, Χλωραντρανιλιπρόλ 14 μέρες}.

Ροδακινιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), {Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Λάμντα Συαλοθρίν Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινοσάντ 7 μέρες } , {Ιντοξακάρμπ 10 μέρες } , {Αμπαμεκτίν+Χλωραντρανιλιπρόλ, Θιαμεθοξάμ + Χλωραντρανιλιπρόλ, Φοσμέτ, Χλωραντρανιλιπρόλ 14 μέρες } , {Χλωρπυριφός μεθύλ 21 μέρες} , {Χλωρπυριφός 20 μέρες} , {Ντιφλουμπενζουρόν 30 μέρες } , {Τ-Φλουβαλινείτ 56 μέρες }.

Νεκταρινιά: Αμπαμεκτίν+Χλωραντρανιλιπρόλ, Θιαμεθοξάμ +Χλωραντρανιλιπρόλ, Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Φοσμέτ, Χλωραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Δαμασκηνιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Χλωραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός.

Αν επιλεγεί κάποια από τις δραστηκές ουσίες

Αμπαμεκτίν+Χλωραντρανιλιπρόλ, Θιαμεθοξάμ +Χλωραντρανιλιπρόλ, Ντιφλουμπενζουρόν, Χλωραντρανιλιπρόλ **η επέμβαση να γίνει ως τις 6 Μάη.**

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι μέρες που αναγράφονται δίπλα στις δραστηκές ουσίες, είναι οι μέρες που μεσολαβούν από την τελευταία επέμβαση ως την συγκομιδή. Να δοθεί μεγάλη προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί σε υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**