



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Πληροφορίες: Ν. Πέττας Γεωπόνος MBA, MSC

Δελτίο
Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Φυτοπροστασίας

ΜΗΛΟΕΙΔΗ
Ν° 6 / 20-07-2015

Για τις περιοχές:
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ: Ορεινές περιοχές

Διαπιστώσεις:

Ξεκίνησε η 2^η πτήση του εντόμου περίπου στις 10/07.

Η έναρξη των εκκολάψεων ξεκίνησε στις 19 Ιουλίου. Το 50% και 90% των εκκολάψεων αναμένονται στις 29 Ιουλίου και στις 10 Αυγούστου, αντίστοιχα.

Εφαρμογή εντομοκτόνων με στόχο τα αυγά ή/και τις προνύμφες της καρπόκαψας:

- Η 1^η εφαρμογή να γίνει άμεσα, δηλαδή με την παραλαβή του δελτίου, με ρυθμιστές ανάπτυξης ή άλλα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται στην ωοαπόθεση [ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΙΕΝΖΟΥΡΟΝ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΧΛΟΡΑΝΘΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ, ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ + ΧΛΟΡΑΝΘΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ, ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ ή το μικροβιακό ιό τύπου κοκκιώσεων]
- Εναλλακτικά, η 1^η εφαρμογή μπορεί να γίνει από 20 έως 27 Ιουλίου, με οργανοφωσφορικά ή συνθετικά πυρεθροειδή ή λοιπά νεότερα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται από την έναρξη των εκκολάψεων [ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ (μόνο Μηλιά), ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΩΣ, ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΦΟΣΜΕΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ-B, ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ, ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΞ (μόνο Μηλιά), ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ, ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ, ΘΕΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ].

Η επανάληψη του ψεκασμού (εναλλακτικά σε 7/14/21 ημέρες) εξαρτάται από την υπολειμματική διάρκεια του εντομοκτόνου, την ένταση της τρέχουσας προσβολής και το ιστορικό του οπωρώνα. Σε περίπτωση επανάληψης του ψεκασμού να προτιμηθεί εντομοκτόνο από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας. Βλέπε επίσης την λίστα με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα & ακαρεοκτόνα, έκδοση 27/04/2015.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει επίσης στην αντιμετώπιση των ακάρεων. Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ: Ορεινές περιοχές

Παρακολούθηση: Εβδομαδιαία δειγματοληψία 5 φύλλων / δέντρο, από 20 σημασμένα δέντρα.

Ορια – Απόφαση επέμβασης:

1. Εάν καταμετρηθούν < 5 ακάρεα κατά μέσο όρο / φύλλο και καθόλου παρουσία αρπακτικού, επανάληψη δειγματοληψίας μετά μία εβδομάδα. Εάν διαπιστωθεί παρουσία αρπακτικού, επανάληψη δειγματοληψίας μετά δύο εβδομάδες
2. Εάν καταμετρηθούν 5-10 ακάρεα κατά μέσο όρο / φύλλο και < 1 αρπακτικό / 10 ακάρεα, επανάληψη δειγματοληψίας μετά μία εβδομάδα.
3. Εάν καταμετρηθούν > 10 ακάρεα κατά μέσο όρο / φύλλο και < 1 αρπακτικό / 10 ακάρεα, τότε επέμβαση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC

Όλα τα δελτία αναρτώνται στον ηλεκτρονικό κόμβο του Υπουργείου www.minagric.gr
Παραλαβή των δελτίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με απλό αίτημα στο pkax-gp@otenet.gr