

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ & ΞΑΝΘΗΣ



Ακμαιο ευδεμίδας

Προνύμφη ευδεμίδας

Βοτρυτής

Ωίδιο

Ταχ. Δίψη:

Αγ. Λουκάς
Τέρμα Αμυνταίου
65110 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ. : 2510800421
Fax: 2510800430

Πληροφορίες: Κ. Λίλης-Δ.Πυργιώτη-
Θ. Μαρκόπουλος - Μ. Ηλιάδου- Γ. Βενέτη
Τηλ:2510-600421-422-420-425

Αρ. Δελτίου:10/07-08-14

ΑΜΠΕΛΙ

Ι. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Η γ'πτήση του εντόμου της ευδεμίδας συνεχίζεται. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι από μέτριος έως πολύ υψηλός. Υπάρχει ακόμη κίνδυνος προσβολής των σταφυλιών και εμφάνισης δευτερογενών προσβολών όπως βοτρυτή,όξινη σήψη κ.α. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σ' αυτή τη γενιά την περίοδο αυτή.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνουν οι παρακάτω ψεκασμοί:

- **11 -12 Αυγούστου** στις πρώιμες περιοχές και περιοχές Αμπέλων, Τριανταφυλλιάς του Ν. Σερρών
- **13 -14 Αυγούστου** στις μεσοπρώιμες περιοχές και περιοχές του Ν. Ξάνθης
- **15 -16 Αυγούστου** στις όψιμες περιοχές

Επανάληψη μετά από **7 - 8** ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη την υπολειμματική διάρκεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το στάδιο ωρίμανσης των σταφυλιών.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Σε σταφύλια που βρίσκονται στο στάδιο ωρίμανσης να προτιμηθούν σκευάσματα του βάκιλλου θουριγγίας.

Συστηλ χρήση
φυτοφαρμάκων
σημαίνει



καλύτερη
φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία
της φύσης
και του
καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες
που το ζητούν



II.ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Συνιστάται να γίνει προληπτικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ευδεμίδας.Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπέλια υγρών περιοχών,αμπέλια σκεπαστά όπως επίσης και σε αμπέλια όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο κατά το στάδιο ωρίμανσης των σταφυλιών.

III. ΩΙΔΙΟ

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση της ασθένειας, στις όψιμες κυρίως ποικιλίες. Σταφύλια ώριμα ή σταφύλια που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης δεν ψεκάζονται.

IV.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα αμπέλια τους και αν παρατηρήσουν την ύπαρξη του εντόμου θα πρέπει να γίνει καταπολέμηση ακόμη και αυτή την περίοδο,κυρίως στις όψιμες ποικιλίες.

V. ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Εμφανίζεται από το ξεκίνημα της ωρίμανσης των σταφυλιών και εκτείνεται κατά την πλήρη ωρίμανση αυτών. Οφείλεται σε βακτήρια και ζακχαρομύκητες. Μεταδίδεται με το έντομο δροσόφιλα(μύγα του ξυδιού).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Σωστή καταπολέμηση της ευδεμίδας και διαφόρων εντόμων, αποφυγή πληγών στα σταφύλια, καθαρισμός των πληγωμένων ραγών από χαλάζι και έγκαιρος ψεκασμός με μια πυρεθρίνη.

Για την αποφυγή εμφάνισης όξινης σήψης χρειάζεται σωστή αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- 1.Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών σύμφωνα με το υπ' αριθ. 03/01-04-2014 Τεχνικό Δελτίο της Υπηρεσίας μας.
2. Να χρησιμοποιηθούν γ. φάρμακα μικρής υπολειμματικής διάρκειας σε αμπέλια που πλησιάζουν στην ωρίμανση.
Σταφύλια έτοιμα προς συγκομιδή δεν ψεκάζονται
3. Όλοι οι παραπάνω ψεκασμοί να γίνουν **μόνο** εφόσον λάβουμε υπόψη την **υπολειμματική διάρκεια** των γεωργικών φαρμάκων και το **στάδιο ωρίμανσης** των σταφυλιών και
4. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η

Προισταμένη Δ/σης

Αδαμίδου Ζωή