


ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Οδός: Πανεπιστημίου (τέρμα)
Τ.Κ.: 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 44055 – 26510 40707
Fax: 26510 41902



ΑΜΠΕΛΙ



D

E

F

G

H

L

M

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.
Βλαστικό στάδιο : «Κλείσιμο τσαμπιού» - «Γυάλισμα».

7. 04 / 8 /2014

ΕΥΔΕΜΙΔΑ (ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑ)

Η πτήση της τρίτης γενιάς ξεκίνησε στην Κέρκυρα και την Λευκάδα.

Ένας ψεκασμός είναι δικαιολογημένος με την λήψη του δελτίου, ΜΟΝΟ σε αμπελώνες της Κέρκυρας και της Λευκάδας που κατά την προηγούμενη γενιά (τ. Ιουνίου-αρ. Ιουλίου) βρέθηκαν στα σταφύλια αρκετές φωλιές διατροφής (περισσότερες από 10 ζημιές-φαγώματα στα 100 τσαμπιά).
Κατάλληλα φάρμακα: βλέπε λίστα που σας έχει σταλεί.



Phytoma.com /image gallery

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ - ΩΙΔΙΟ

Να συνεχιστεί η προστασία όσο οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση των ασθενειών
Μετά από το στάδιο του γυάλισματος οι ράγες δεν προσβάλλονται, όμως τα φύλλα οι βλαστοί και οι βόστρυχοι εξακολουθούν να είναι ευαίσθητοι.

Στους αμπελώνες που είχαν προστατευτεί επαρκώς και δεν έχουν μολυνθεί, μπορεί να γίνεται στο εξής και χρήση φαρμάκων με δράση αποκλειστικά επαφής, που θα επαναλαμβάνονται μετά από ξέπλυμα από βροχή. **Κατάλληλα φάρμακα: βλέπε λίστα που σας έχει σταλεί.**

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Στο στάδιο του «γυαλισματος» (περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων) **να γίνει ψεκάσμος με ειδικό βοτρυδιοκτόνο** σε όλες τις ευαίσθητες ποικιλίες (π.χ. Ντεμπίνα κ.α.). Η επέμβαση μπορεί να αφορά μόνο την ζώνη των σταφυλιών. Σε περιοχές που το σάπισμα παρουσιάζετε κάθε χρόνο (υγρά, ζωνρά, υπερπαραγωγικά αμπέλια), να γίνει **επανάληψη** του ψεκάσμου κατά την ωρίμανση. Το ξεφύλλισμα όταν πλησιάζει η ωρίμανση, βοηθάει στην αντιμετώπιση της ασθένειας καθώς επιτρέπει τον καλύτερο αερισμό των σταφυλιών. Κατάλληλα φάρμακα βλ. λίστα.

ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Η σήψη αρχίζει από πληγή της ράγας κι επεκτείνεται γρήγορα στο υπόλοιπο μέρος του σταφυλιού. Χαρακτηριστικό της σήψης είναι η **οσμή ξυδιού** που αναδίδεται από τα προσβεβλημένα τμήματα. **Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη της Ώξινης Σήψης στον αμπελώνα ενδείκνυται η διενέργεια ψεκάσμου με εντομοκτόνο (δελταμεθρίν, υπερμεθρίν 7 ημέρες κ.α.) για καταπολέμηση των εντόμων φορέων της ασθένειας, μαζί με την προσθήκη ενός χαλκούχου σκευάσματος (21 μέρες).**

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα (βλ λίστα ΔΓΠ 2.28/3/2014), να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα της συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν, μην κάνετε υπέρβαση των δόσεων και να ελέγχετε την συνδυαστικότητα των γεωργικών φαρμάκων. Να γίνονται εναλλαγές στη χρήση των ομάδων και των κατηγοριών των σκευασμάτων ως προς τον τόπο Δράσης, για να προληφθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των ασθενειών στα φάρμακα.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι αμπελουργοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο:

(<http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/134-ioannina>).