



No 38 / 12 Ιουνίου 2014

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

ΠΕΔΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ**A. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (*Cydia pomonella* L., Lepidoptera: Tortricidae)**

- Ξεκίνησε η 2^η πτήση του εντόμου. Η έναρξη των ωοτοκίων υπολογίζεται από τις 12 Ιουνίου. Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται στις 17 Ιουνίου.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	17-19 Ιουνίου και δύο επαναλήψεις 25-27 Ιουνίου και 3-5 Ιουλίου	CpGV (9)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	12-16 Ιουνίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Chlorantraniliprole (2), Fenoxycarb (2), Diflubenzuron (4), Methoxyfenozide (3)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	17-19 Ιουνίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Cyfluthrin (1), Deltamethrin (2), Emamectin* (3), Etofenprox* (3), Indoxacarb (3), Lambda cyhalothrin (2), Phosmet (1), Spinosad (3), tau-Fluvalinate (2), Thiacloprid (1)

- Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες (*Phyllonorycter blancardella* και *Phyllonorycter corylifoliella*, Lepidoptera: Gracillariidae).
- * Έγκριση μόνο για μηλιά



**Β. ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ: Σέζια (*Synanthedon myopaeformis* Borkhausen, *Lepidoptera: Sesiidae*)
Κόσσο (*Cossus cossus* Linnaeus, *Lepidoptera: Cossidae*),
Ζευζέρα (*Zeuzera pyrina* Linnaeus, *Lepidoptera: Cossidae*)**

- Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης καταπολέμησης με την καρπόκαψα εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εγκεκριμένη δραστική ουσία : Chlorpyrifos).
- Για τη σέζια ο ψεκασμός να κατευθύνεται στον κορμό και στους βραχίονες
- Για τον κόσσο ο ψεκασμός να κατευθύνεται στο λαιμό και στον κορμό.
- Για τη ζευζέρα ο ψεκασμός να κατευθύνεται στις κορυφές.

Γ. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (*Venturia inaequalis* Cooke Wint. *Venturia pirina* Aderhold)

- Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη επαναμολύνσεων της ασθένειας. Έχουν διαπιστωθεί έντονα συμπτώματα επαναμολύνσεων σε φύλλα και καρπούς.
- Συνιστάται η προστασία των καρπιδίων και των φύλλων με διασυστηματικά μυκητοκτόνα (θεραπευτικά) ή με μείγματα τους με επαφής από το σύνολο των παραγωγών.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως στο δελτίο 24/28-4-14.
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Δ. ΩΙΔΙΟ (*Podosphaera leucotricha* Ell. and Ev. Salm.)

- Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των δένδρων με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως στο δελτίο 29/14-5-14.
- Συνιστάται η συνδυασμένη καταπολέμηση με το Φουζικλάδι.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (*Cydia funebrana* Treitschke, *Lepidoptera: Tortricidae*)

- Η πτήση των ενήλικων της 2^{ης} γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης:
 - Chlorantraniliprole, Diflubenzuron **13-17 Ιουνίου**.
 - Chlorpyrifos, Deltamethrin **18-20 Ιουνίου**.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη