



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

9/4-3-14

Α. ΑΧΛΑΔΙΑ

Βλαστικά στάδια



Γ



Γ₃



Δ



Δ₃



Ε

1. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις:

Ο καιρός του τριημέρου δημιούργησε συνθήκες ελαφριάς ως μέτριας μόλυνσης μόνο στις πεδινές περιοχές. Στις όψιμες ορεινές περιοχές οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν ευνόησαν μολύνσεις και οι αχλαδιές βρίσκονται σε μεγαλύτερο ποσοστό στο βλαστικό στάδιο Γ₃.

Οδηγίες:

Στις πρώιμες περιοχές να γίνει άμεσα επέμβαση με χρήση σκευάσματος με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
Στις όψιμες περιοχές να χρησιμοποιηθεί ένα εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.

Φυτ/κά Προϊόντα

Α. Προστατευτική δράση: Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Μανκοζέμπ (όχι σε κρυστάλλι και Κόσια), Μετιράμ (όχι σε Κόσια), Ντιθιανόν (έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν (έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση).

Β. Προστατευτική και θεραπευτική δράση:

Θειοφανείτ-μεθύλ {1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο},
Μυκλομπουτανίλ, Μπосκαλίнт+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+
Πυρακλοστρομπίν, Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροντινίλ,
Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ, Τριφλοξιστρομπίν, Τριφλοξιστρομπίν+
Κάπταν, Φλουοπιυράμ+Τεμπουκοναζόλ.

-Μην ξεπερνάτε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

- Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών (και διαφορετικός τρόπος δράσης της δ.ο) στο πρόγραμμα επεμβάσεων.

- Υπάρχουν δραστικές ουσίες με θεραπευτική δράση οι οποίες καλό είναι να χρησιμοποιούνται προληπτικά πχ *Θειοφανείτ μεθύλ* κ.α ►

2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Οδηγίες: Στους οπωρώνες που πέρυσι υπήρχαν προσβολές (Αγ. Βασίλειος, Κλένια Κορινθίας) και ιδιαίτερα στην ποικιλία «Κοντούλα» **να γίνει άμεσα επέμβαση με Φοσετύλ –ΑΙ .**
Επιβάλλεται συνεχής έλεγχος των δενδροκομείων για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών.
ΤΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΡΟΣ ΥΓΙΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ.
Βλέπε προηγούμενο δελτίο

3. ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ

Τα ακμαία θηλυκά ωτοκοούν επάνω στα άνθη της αχλαδιάς (στη βάση του κάλυκα). Οι νεαρές προνύμφες, που εκκολάπτονται σε λίγες μέρες, διεισδύουν στο εσωτερικό των μικρών καρπών απ' όπου και τρέφονται.

Συμπτώματα: Οι προσβεβλημένοι νεαροί καρποί παρουσιάζουν παραμορφώσεις, σκοτεινές κηλίδες και τελικά πέφτουν.

Οδηγίες: **Σε οπωρώνες που υπάρχει δεδομένο προσβολών, να γίνει επέμβαση στην πτώση των πετάλων.**

Φυτ/κά

προϊόντα: Δελταμεθρίν, Φοσμέτ,.

4. ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΧΛΑΔΙΩΝ (Contarinia pyrivora)

Τα ενήλικα θηλυκά ωτοκοούν μέσα στα κλειστά άνθη πριν ακόμη ανοίξουν (βλαστικό στάδιο Δ3-Ε). Οι νεαρές προνύμφες εκκολάπτονται σε λίγες μέρες και τρέφονται με το εσωτερικό της ωοθήκης.

Συμπτώματα: Τα προσβεβλημένα καρπίδια είναι μεγαλύτερα από τα απρόσβλητα, συχνά παραμορφωμένα και στη συνέχεια μαυρίζουν και πέφτουν.

Οδηγίες: **Σε οπωρώνες όπου κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές, συνιστάται ένας ψεκάσμος στο στάδιο Δ3-Ε (κλειστά διογκωμένα άνθη πριν ακόμη αυτά ανοίξουν) με εγκεκριμένο εντομοκτόνο.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ