

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Ωίδιο. Κηλίδες όπως φαίνονται στην πάνω επιφάνεια. Είναι πιο ανοιχτού χρώματος και λιγότερο έντονες από τον περονόσπορο.

Περονόσπορος. Κηλίδες λαδιού στην πάνω επιφάνεια του φύλλου.

Περονόσπορος. Οι «λαδιές» με υγρασία δίνουν λευκές χιονώδεις εξανθήσεις **μόνο** στην κάτω επιφάνεια του φύλλου.



Θρίπες.



Ψευδόκοκκος. Νύμφες και έντονη παρουσία μυρμηγκιών. Την εποχή αυτή εντοπίζεται κάτω από το ρυτίδωμα στο άνω μέρος του κορμού και στους βραχίονες.

<p>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: (<i>Plasmopara viticola</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>– Οι δροσιές που σημειώνονται διατηρούν την ασθένεια η οποία γίνεται αντιληπτή σε ολόενα και περισσότερες θέσεις.</p> <p>– Παρατηρείται μια αργή αλλά σταθερή εξέλιξη της ασθένειας.</p> <p>– Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την ευαισθησία των σταφυλιών την περίοδο αυτή, η προστασία των αμπελιών είναι απαραίτητη.</p> <p>– Σε περιοχές που υπάρχει να γίνονται επεμβάσεις με διασυστηματικά ή διελασματικά σκευάσματα.</p> <p>– Σε περιοχές με έντονες δροσιές όλα τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα.</p>
<p>ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν νέους κύκλους της ασθένειας και τα στάδια που διανύουμε είναι πολύ ευαίσθητα.</p> <p>Τα αμπέλια πρέπει να προστατεύονται συνεχώς. Σε περίπτωση που γίνει ψεκασμός για τον περονόσπορο μπορεί να γίνει συνδυασμένη επέμβαση.</p>
<p>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca spp</i>)</p>	<p>Σημαντικοί πληθυσμοί διαπιστώνονται στην πλειονότητα των αμπελιών. Να γίνεται έλεγχος στην ακραία βλάβιση και να γίνεται επέμβαση όπου εμφανίζεται.</p>
<p>ΘΡΙΠΑΣ: (<i>Drepanothrips reuteri</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Να ελέγχονται τακτικά τα αμπέλια για θρίπα, από το μούρο μέχρι και την άνθηση, με τσίγκο των ταξιανθιών πάνω σε λευκό χαρτί.</p> <p>Σε περίπτωση παρουσίας του εντόμου συνιστάται άμεση επέμβαση μόνο στα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση.</p>
<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (<i>Lobesia botrana</i>)</p>	<p>Δεν υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης προς το παρόν. θα ειδοποιηθείτε με νεότερο δελτίο για την εξέλιξη του εντόμου.</p>
<p>ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ: (<i>Planococcus ficus</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>- Να ελέγχονται τα πρέμνα με προσεκτική αφαίρεση του ρυτιδώματος. Η έντονη παρουσία μυρμηγκιών προδίδει τις θέσεις του πλανόκοκκου.</p> <p>- Όπου υπάρχει ιστορικό με προσβολές την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο ή εντοπίζονται πληθυσμοί, να γίνονται ψεκασμοί είτε πριν την άνθηση είτε μετά την καρπόδεση ανάλογα με το σκεύασμα.</p>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας αποστείλαμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 14 Μαΐου 2014

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τρουλλάκης Γιάννης