



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Πανεπιστημίου 334  
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ  
Τηλ.: 2610.224.629  
Fax: 2610.623.238  
Email: [pkpfpatr@otenet.gr](mailto:pkpfpatr@otenet.gr)  
Πληροφορίες: Πέππας Ν.

**ΔΕΛΤΙΟ  
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ

**ΠΑΤΑΤΑ: Ν° 2 / 26-02-2014**

**ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:**

**Διαπιστώσεις:** Η κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη των πατατοφυτειών έχει ως εξής:  
Στη Μεσσηνία, το φύτευμα ξεκίνησε από το πρώτο 10-ήμερο του Ιανουαρίου και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου είχαν φυτρώσει οι περισσότερες φυτείες. Σήμερα, οι περισσότερες καλλιέργειες βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από τον περονόσπορο.  
Στην πρώιμη παραλιακή ζώνη της Αχαΐας & Ηλείας το φύτευμα ξεκίνησε από τις αρχές του Φλεβάρη, αλλά η εμφάνιση κρύου βοριά καθυστέρησε ελαφρά την ανάπτυξη. Σήμερα βρίσκονται στο στάδιο του σκαλίσματος. Στα οψιμότερα εδάφη της περιοχής οι καλλιέργειες βρίσκονται στο φύτευμα.  
Οι βροχοπτώσεις σε όλες τις περιοχές συνετέλεσαν ώστε τα φύλλα να μείνουν βρεγμένα για πολλές συνεχείς ώρες, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των μολύνσεων. Επίσης, η θερμοκρασία τις αντίστοιχες περιόδους ήταν αρκετά υψηλή, γεγονός που τις διευκόλυσε. Ενδεικτικά, για την Ηλεία, η έναρξη των ψεκασμών προσδιορίστηκε στο 1<sup>ο</sup> δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Μετ. Σταθμός Κοροΐβου-Γαστούνης Ηλείας (Μέσοι όροι)

10-ήμερο	Ελάχ Θερμ (°C)	Μέγ Θερμ (°C)	Μέση Θερμ (°C)	Βροχή (χιλ)	Μέση ΣχΥγρ (%)	Διάρκεια διύγρανσης (ώρες)
1ο Ιανουαρίου	5.83	16.49	10.12	33.8	73.75	19.4
2ο Ιανουαρίου	9.37	17.35	12.75	28.4	77.95	18.8
3ο Ιανουαρίου	7.49	14.86	10.93	60	68.45	15.64
1ο Φεβρουαρίου	7.51	14.71	10.69	0.8	81.01	19.9
2ο Φεβρουαρίου	6.04	18.1	11.54	0	63.6	16.6

**Συστάσεις:** Σε όλες τις περιοχές θα αυξηθούν οι θερμοκρασίες και σε συνδυασμό με την μεγάλη ατμοσφαιρική υγρασία θα δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για δευτερογενείς μολύνσεις. Οι φυτείες που βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από την ασθένεια (ύψος μεγαλύτερο από 15-20 εκ.) πρέπει να προστατεύονται συνεχώς με 5-θήμερες επεμβάσεις.

**Φάρμακα:** Από την λίστα των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών του έτους 2014 (έκδοση 18/02/2014), επιλέξτε κυρίως τα προστατευτικά, με τις μικρότερες συνιστώμενες δόσεις και το μικρότερο μεσοδιάστημα μεταξύ των ψεκασμών

Σημειώνεται, ότι η καταπολέμηση του Περονόσπορου της πατάτας είναι προληπτική. Η προστασία πρέπει να είναι συνεχής, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη διάρκεια δράσης των φυτοπροστατευτικών, την ύπαρξη ή όχι φυτών εθελοντών και σωρών ασυγκόμιστης και καταστραμμένης πατάτας. Ακόμα και τα προστατευτικά που έχουν θεραπευτική δράση πρέπει να χρησιμοποιούνται προληπτικά.

Όλα τα δελτία είναι αναρτημένα στον κόμβο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ**

**ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
Msc/Msc Τεχν. Τροφίμων**

Παραλαβή των δελτίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με απλό αίτημα στο [pkpfpatr@otenet.gr](mailto:pkpfpatr@otenet.gr)