



No 26 / 5 Αυγούστου 2013

Υφούλης Αντώνης
Λαΐδου Ιωάννα
Μακρίδου Ευγενία**ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ****A. ΚΑΡΙΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ (*Cydia pomonella* L., Lepidoptera: Tortricidae)**

- Ξεκίνησε η 3^η πτήση του εντόμου.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

	ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (υψόμετρο > 250μ)	Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	10-12 Αυγούστου και δύο επαναλήψεις 17-19 και 24-26 Αυγούστου	17-19 Αυγούστου και δύο επαναλήψεις 24-25 και 30-31 Αυγούστου	CpGV (9)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	5-9 Αυγούστου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	9-13 Αυγούστου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Chlorantraniliprole (2), Fenoxycarb (2), Diflubenzuron (4), Methoxyfenozide (3)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	10-12 Αυγούστου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	17-19 Αυγούστου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos- methyl (1), Cyfluthrin (1), Deltamethrin (2), Emamectin* (3), Etofenprox* (3), Indoxacarb (3), Phosmet (1), Spinosad (3), tau-Fluvalinate (2), Thiacloprid (1)

- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- * Έγκριση μόνο για μηλιά

B. ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ, ΝΑΡΚΕΣ ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΩΝ**(*Phyllonorycter blancardella* και *Phyllonorycter corylifoliella*, Lepidoptera: Gracillariidae)**

- Δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή. Η επέμβαση για την καρπόκαμα καταπολεμά και τις νάρκες.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Acetamiprid, Beta-cyfluthrin,

ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ