

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkrpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ



Χαρακτηριστικά συμπτώματα
κυκλοκονίου σε φύλλα ελιάς.



Όγκοι από το βακτήριο της
καρκίνωσης σε κλαδιά ελιάς.



Ανάπτυξη καπνιάς σε κλαδί ελιάς.

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιονάκη

24.

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ:

(*Spilocaea
oleaginea*)

Διαπιστώσεις:

Οδηγίες:

Ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τα φύλλα προκαλώντας πρόωρη φυλλόπτωση και εξασθένηση των δέντρων.

Πτώση της θερμοκρασίας (16-20°C) και βροχερός ή πολύ υγρός καιρός ευνοούν τις μολύνσεις που εκδηλώνονται με χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες (μάτια παγωνιού) στην επάνω επιφάνεια των φύλλων.

Ευπαθείς ποικιλίες : Θρουμπολιά, Καλαμών, Άμφισσας και Τσουνάτη.

Η Κορωνέικη (ψιλολιά) είναι σχετικά ανθεκτική.

- Κατάλληλο κλάδεμα περιορίζει την ασθένεια.
- Συνιστάται προληπτικός ψεκασμός με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα σε ελαιόδεντρα ευπαθών ποικιλιών που βρίσκονται σε υγρές περιοχές, πριν τις επόμενες βροχοπτώσεις.

<p>ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ: (<i>Pseudomonas savastanoi</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Η ασθένεια οφείλεται σε βακτήριο που προκαλεί εξογκώματα, γνωστά σαν καρκινώματα στα κλαδιά, στους βραχίονες και στον κορμό των ελαιοδέντρων.</p> <p><u>Μολύνσεις μπορεί να συμβούν εφόσον επικρατεί υγρός ή βροχερός καιρός και υπάρχουν στα δέντρα μη επουλωμένες πληγές από ράβδισμα, κλάδεμα ή μετά από παγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεμο.</u></p> <p><u>Η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι πολύ ευαίσθητη στο βακτήριο.</u></p> <p>Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αποφυγή ραβδίσματος και κλαδέματος των δέντρων με βροχερό καιρό. - Προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχο μυκητοκτόνο αμέσως μετά από παγετό, χαλάζι, ράβδισμα, κλάδεμα. - Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδιών κατά την ξηρή περίοδο. Εφόσον οι όγκοι εντοπίζονται στον κορμό ή στους βραχίονες πρέπει να αφαιρούνται με κοφτερό μαχαίρι και οι πληγές να επαλείφονται με πυκνό βορδιγάλειο πολτό. Τα εργαλεία κλαδέματος πρέπει να απολυμαίνονται. - Στην φύτευση νέου ελαιώνα να χρησιμοποιούνται υγιή δενδρύλλια, απαλλαγμένα από την ασθένεια και να αποφεύγεται η πυκνή φύτευση.
<p>ΚΑΠΝΙΑ: (<i>Capnodium oleoprhilum</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Πρόκειται για μύκητα που αναπτύσσεται πάνω σε μελιτώδεις εκκρίσεις εντόμων, κυρίως του λεκανίου. Κλαδίσκοι, βλαστοί και φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς που δυσχεραίνει τις φυσιολογικές λειτουργίες (αναπνοή, διαπνοή, φωτοσύνθεση). Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες με πυκνή βλάστηση.</p> <p>Η καταπολέμηση του λεκανίου και το κατάλληλο κλάδεμα που εξασφαλίζει τον καλό αερισμό του εσωτερικού της κόμης περιορίζουν την καπνιά.</p> <p><u>Μια επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα μετά τη συγκομιδή βοηθάει στον καθαρισμό των δέντρων.</u></p>
<p>ΛΕΙΧΗΝΕΣ :</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Κιτρινοπράσινο επίχρισμα που καλύπτει τον κορμό και τους κλάδους των ελαιοδέντρων σε υγρές κυρίως περιοχές.</p> <p>Ψεκασμοί <u>κορμών και κλάδων</u> κατά τη διάρκεια του χειμώνα με χαλκούχα σκευάσματα βοηθάνε στην αποκόλληση των λειχήνων.</p>

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέγετε τα φάρμακα από τις λίστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει. Φροντίστε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής. Οι εφαρμογές χαλκούχων σκευασμάτων πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Ηράκλειο 8 Οκτωβρίου 2013
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης