

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

### ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436  
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663  
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

**No 39 / 30 Ιουνίου 2016**

## ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

### **ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ**

(*Cydia splendana* Hübner, Lepidoptera: Tortricidae)

- Ξεκίνησε η πτήση του εντόμου.
- Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από περιοχές της ΠΙΕΡΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ, ΣΚΟΤΙΝΑ, Μ. ΜΗΛΙΑ) σε συνεργασία με την Δ.Α.Ο.Κ. ΠΙΕΡΙΑΣ.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):



		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την <u>εναπόθεση</u> <b>των ωών</b>	<b>4-8</b> <b>Ιουλίου</b>	Chlorantraniliprole (2)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την <u>εκκόλαση</u> <b>των ωών</b>	<b>10-12</b> <b>Ιουλίου</b>	Deltamethrin (2), Lambda cyhalothrin (2)

- Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

## ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ

(*Mycosphaerella maculiformis* (Pers.) J. Schröt.)

- Τα συμπτώματα της ασθένειας έχουν εμφανιστεί σε πολλές περιοχές από τα μέσα Ιουνίου. Οι καιρικές συνθήκες του μήνα ευνοούν την ανάπτυξη του παθογόνου.
- Ο μύκητας προσβάλλει τα φύλλα, όπου προκαλεί πολυάριθμες μικρές πολυγωνικές νεκρωτικές κηλίδες καστανού χρώματος. Συχνά πολλές κηλίδες ενώνονται και σχηματίζουν ευρύτερες νεκρωτικές επιφάνειες ενώ το φύλλο παίρνει κιτρινωπό χρώμα.
- Μετά την προσβολή ακολουθεί πρόωρη φυλλόπτωση η οποία όταν οι κλιματικές συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για την ασθένεια, φθάνει μέχρι και την ολοκληρωτική αποφύλλωση των δέντρων.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Boscalid + Pyraclostrobin (2).
- Η επέμβαση μπορεί να γίνει από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος.
- Χρονικό διάστημα αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή 28 ημέρες.



Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος

Ευστράτιος Δαδάκης