



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

31/3-6-15

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: Η 2^η πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

Οδηγίες: Επέμβαση στις ανωτέρω περιοχές, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φυτ/κά **Α. Άμεσα με Φενοξικάρμπ.**

προϊόντα: **Β. Μέχρι τις 7 Ιουνίου με:**

Μεθοξυφenoζάντ, Χλοραντρανιλιπρόλ. Χλοραντρανιλιπρόλ+Θιαμεθοξάμ

Γ. Από 8 μέχρι 12 Ιουνίου με:

Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες, Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εσφενβαλερέιτ, Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν-μπενζοέιτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα-Συαλοθρίν, Μπέτα -Συφλουθρίν, Πυρεθρίνς, Σπινοςάντ, Συπερμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός - μεθύλ.

Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να διασπείρεται στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Μια ελαφριά αποφύλλωση είναι χρήσιμη. Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να είναι αμφίπλευρη. Η ταχύτητα των ψεκαστικών μηχανημάτων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού υγρού.

Για τις όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Διαπιστώσεις: Οι εκκολάψεις έχουν σχεδόν τελειώσει και ο περισσότερος πληθυσμός είναι νύμφες πρώτου σταδίου.

Οδηγίες: **Ελέγξτε τα αμπέλια με μεγάλη προσοχή (κυρίως κάτω από τα ρυτιδώματα και πρέμνα που κυκλοφορούν μυρμήγκια). Σε αμπελώνες που πέρσι υπήρχαν προσβολές και δεν έγινε σωστή καταπολέμηση, θα υπάρχουν και φέτος. Όπου διαπιστώνετε την ύπαρξη του εντόμου, να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.**

Το ψεκαστικό υγρό να βρίσκει τις αποικίες του εντόμου και καλό είναι να περνάει και μέσα στα ρυτιδώματα. Ο επαρκής αερισμός και ο φωτισμός είναι ανασταλτικοί παράγοντες για το έντομο. Να σημαδεύονται τα πρέμνα που έχουν προσβολή (με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η μεταφορά του εντόμου σε υγιή πρέμνα και δίνεται η δυνατότητα καλύτερου ελέγχου και καταπολέμησης).

Φυτ/κά
προϊόντα:

Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός – μεθύλ.



3. ΩΙΔΙΟ

Οδηγίες:

Οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές. Να συνεχιστεί η προστασία. Οι επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την διάρκεια δράσης των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων. Οι επέμβαση να είναι σχολαστική και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολών και ευαίσθητες ποικιλίες.

Φυτ/κά προϊόντα:

Βλέπε δελτίο 14/7-4-15.

Οι επεμβάσεις με κάθε δραστική ουσία ανά καλλιεργητική περίοδο, να μην υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του σκευάσματος.

- Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών στο πρόγραμμα των επεμβάσεων για να αποφευχθεί η δημιουργία ανθεκτικότητας.
- Οι παρεμποδιστές βιοσύνθεσης εργοστερόλης, να μην εναλλάσσονται μεταξύ τους και οι επεμβάσεις με τα ανωτέρω να μην υπερβαίνουν τις (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Να γίνεται καλή κάλυψη όλων των ευαίσθητων οργάνων του αμπελιού. Οι εφαρμογές να γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες.

4. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις- Οδηγίες:

Η αστάθεια του καιρού μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ελέγχετε συστηματικά τους αμπελώνες για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών.

Φυτ/κά προϊόντα:

Βλέπε δελτίο 17/17-4-15.

5. ΧΑΛΑΖΙ

Οδηγίες:

Μετά από χαλαζόπτωση και μέσα στο πρώτο 24ωρο, να επεμβαίνετε με χαλκούχο σκεύασμα. Προσοχή στις φυτοτοξικότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Μην υπερβαίνετε τις αναγραφόμενες δόσεις των σκευασμάτων.
2. Μην αναμιγνύετε περισσότερα από δύο σκευάσματα στο ίδιο ψεκαστικό διάλυμα.
3. Οι άκαιρες και χωρίς λόγο επεμβάσεις, επιβαρύνουν οικονομικά και ζημιώνουν το περιβάλλον.
4. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ