

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη

Τ.Κ. 38334 Βόλος

Τηλέφωνο: 24210 66525

Fax: 24210 69545

e-mail: fyto12@otenet.gr

Πληροφορίες: Δρ. Ανδρέογλου Φωτεινή

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων:

- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών

- επιβαρύνει το περιβάλλον

- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΣΙΤΗΡΑ Ν° 1 / 4-3-2016

ΣΙΤΑΡΙ

Από επιτόπους ελέγχους σε καλλιέργειες σιταριού στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, αλλά και από εξετάσεις δειγμάτων που έχουν προσκομισθεί στην Υπηρεσία μας, έχουν διαπιστωθεί προσβολές από ωΐδιο (*Erysiphe graminis* f.sp. *tritici*), οι οποίες κατά τόπους είναι έντονες. Παρόμοιες παρατηρήσεις έχουν αναφερθεί από τα Εργαστήρια Φυτοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λάρισας.

Τα συμπτώματα της προσβολής είναι ο σχηματισμός λευκών έως γκριζόλευκων επανθήσεων στην άνω επιφάνεια των κατώτερων αρχικά φύλλων (εικόνα 1). Οι επανθήσεις αυτές εμφανίζονται μεμονωμένα κατά θέσεις, ενώ αργότερα συνενώνονται και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της φυλλικής επιφάνειας. Σε έντονες προσβολές οι ιστοί αποξηραίνονται.



Εικ. 1. Λευκές επανθήσεις ωΐδιου σε φύλλο σιταριού.

Η άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης της ασθένειας είναι 15-22 °C, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι τα κονίδια (σπόρια) του μύκητα μπορούν να βλαστήσουν σε εύρος 1-30 °C, χωρίς την παρουσία ελεύθερης υγρασίας.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να επισκέπτονται και να παρατηρούν τα κτήματά τους. Σε περίπτωση έντονης προσβολής συστήνεται άμεσα ψεκάσμος με ένα εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Η απόφαση για ψεκάσμο θα πρέπει να παίρνεται πάντα σε συνεργασία με τους κατά τόπους γεωπόνους.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: *azoxystrobin, cyproconazole, fenpropimorph, picoxystrobin, prochloraz, propiconazole, prothioconazole, pyraclostrobin, sulphur, tebuconazole, triadimenol, trifloxystrobin*

- **Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr
- **Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τις γεωργικές προειδοποιήσεις για τα σιτηρά, παρακαλούνται να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία μας, στη διεύθυνση: fyto12@otenet.gr**

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος α.α.

Δρ. Λύκας Δημήτριος