

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr

Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής – Βαγγέλης Α. Αλατσοτιανός

3.



Βαλάνινος. Το σκαθάρι.



Βαλάνινος. Η προνύμφη και η ζημιά.



Καρπόκαμα. Προνύμφη και ζημιά.



Ζημιά από την προνύμφη του *Pammene fasciana*

<p>ΒΑΛΑΝΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ: (<i>Curculio elephas</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Σημείωση:</p>	<p>–Το μικρό αυτό σκαθάρι με το μεγάλο ρύγχος έχει μια γενιά το χρόνο και προσβάλλει τα κάστανα λίγο πριν την ωρίμανση.</p> <p>–Παρότι οι περισσότερες ωτοκίες παρατηρούνται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, ανάλογα με την προωμότητα της περιοχής και της ποικιλίας, η αντιμετώπιση του εντόμου γίνεται νωρίτερα καθώς στοχεύει τα ακμαία (σκαθάρια) πριν αυτά ωτοκήσουν στους καρπούς.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όπου έχει ήδη πραγματοποιηθεί ψεκασμός και σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις κατά το διήμερο 14 - 15 του μήνα, θα πρέπει να επαναληφθεί άμεσα λόγω έκπλυσης του φαρμάκου. • Συνιστάται στις <u>όψιμες ποικιλίες</u> ένας ψεκασμός κάλυψης το διάστημα: 20 - 25 Αυγούστου. <p>Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι σημαντική μείωση των πληθυσμών για την επόμενη χρονιά επιτυγχάνεται με την <u>συλλογή και καταστροφή όλων των πεσμένων προσβεβλημένων καστώνων</u>. Οι προνύμφες μόλις ολοκληρώσουν της ανάπτυξή τους βγαίνουν από τον καρπό, μπαίνουν στο έδαφος, περνούν εκεί τον χειμώνα και τα ενήλικα βγαίνουν την επόμενη χρονιά, την ίδια εποχή, στις ίδιες θέσεις.</p>
<p>ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ: (<i>Pammene fasciana</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Συνεχίζεται η καταγραφή των ακμαίων στο δίκτυο παρακολούθησης και οι προσβολές στους καρπούς σε ορισμένες περιοχές είναι σημαντικές.</p> <p>Ο ψεκασμός εναντίων του βαλάνινου των καστώνων μειώνει ικανοποιητικά τους πληθυσμούς του εντόμου.</p>
<p>ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ: (<i>Laspeyresia splendana</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>–Είναι μια μικρή πεταλούδα που γεννά σε φύλλα που βρίσκονται κοντά σε κάστανα, τα οποία στη συνέχεια προσβάλλουν οι εκκολαπτόμενες προνύμφες.</p> <p>–Στο νομό Χανίων σε ορισμένες περιοχές προκαλεί ζημιές, μικρότερες όμως σε σχέση με τον βαλάνινο και το σκουλήκι των νεαρών καστώνων.</p> <p>–Στο δίκτυο παρακολούθησης καταγράφονται πληθυσμοί του εντόμου.</p> <p>Με την επέμβαση και τα προτεινόμενα καλλιεργητικά μέτρα που συστήθηκαν για τον βαλάνινο επιτυγχάνεται ικανοποιητική αντιμετώπιση της καρπόκαψας.</p>

ΦΑΡΜΑΚΑ: Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για την καλλιέργεια της καστανιάς και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή είναι: ορισμένα σκευάσματα με δραστική ουσία *deltamethrin* (30ημ.) ορισμένα με δραστική *lambda cyhalothrin* (14ημ.) και το *chlorantraniliprole* (21ημ.) (*Coragen 20 SC*).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το Τεχνικό Δελτίο για την καλλιέργεια της καστανιάς στο ν. Χανίων εκδίδεται σε συνεργασία με το Τ.Α.Α. Χανίων, το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου της ΔΑΟΚ Χανίων και την “Αναπτυξιακή Εννιά Χωριών”.

Ηράκλειο 18 Αυγούστου 2015

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη