

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 45 / 9 Αυγούστου 2016

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ ΕΛΙΑΣ

(Palpita unionalis Hübner, *Lepidoptera: Pyralidae*)

- Ξεκίνησε η πτήση του εντόμου με σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων.
- Οι προνύμφες του εντόμου προκαλούν ζημιές κυρίως στις κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών βλαστών, αλλά μερικές φορές προσβάλλει και καρπούς, περισσότερο στα σημεία επαφής τους, παρά μεμονωμένους καρπούς ελιάς. Κατά προτεραιότητα προσβάλλει τους καρπούς που βρίσκονται κοντά στην τρυφερή βλάστηση.
- Από δειγματοληψίες και επιτόπιες παρατηρήσεις σε αρκετές περιοχές των νομών Πιερίας και Χαλκιδικής διαπιστώθηκε έντονη προνυμφική δραστηριότητα από τις προνύμφες της Μαργαρόνιας.
- Όπου διαπιστώθηκε έντονη προσβολή στην τρυφερή βλάστηση, συνιστάται επέμβαση το χρονικό διάστημα **11-14 Αυγούστου**, φροντίζοντας να λούζονται και οι λαίμαργοι βλαστοί στη βάση του δέντρου.
- Σε φυτώρια, νεαρά δέντρα και σ' αυτά που έχει γίνει κλάδεμα ανανέωσης η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): deltamethrin (1), lambda cyhalothrin + thiamethoxam (2).



Οι προνύμφες προσβάλλουν την ακραία τρυφερή βλάστηση με καταστροφικές συνέπειες στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση των νεαρών κυρίως δέντρων



Οι προνύμφες συστρέφουν τα φύλλα και τα ενώνουν με μετάξινα νήματα προκειμένου να νυμφωθούν

Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος

Ευστράτιος Δαδάκης