

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkrpfhgpr@otenet.gr


Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

11.



Ευδεμίδα. Αυγό σε ράγα.



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγα.



Περονόσπορος. Κηλίδες λαδιού στην πάνω επιφάνεια του φύλλου.



Περονόσπορος. Οι «λαδιές» με υγρασία δίνουν λευκές χιονώδεις εξανθήσεις μόνο στην κάτω πλευρά του φύλλου.



Ωίδιο. Αλευρώδες επίχρισμα (σπόρια) σε φύλλα - βλαστό και κατοάρωμα του φύλλου.



Ωίδιο. Κηλίδες όπως φαίνονται στην πάνω επιφάνεια. Είναι πιο ανοιχτού χρώματος και λιγότερο έντονες από τον περονόσπορο..



<p>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: (<i>Plasmopara viticola</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>– Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών (ύψους 1-54 χιλ.) έδωσαν ισχυρές διυγράνσεις στο φύλλωμα και υψηλή σχετική υγρασία μεγάλης διάρκειας.</p> <p>– Οι παραπάνω συνθήκες σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία της περιόδου (μέση θερμοκρασία 16 – 20 °C) και την έκπτωση νέας βλάστησης δημιουργούν <u>ιδανικές συνθήκες</u> για δυναμικές μολύνσεις περονοσπόρου.</p> <p>– Τα νέα συμπτώματα θα εμφανιστούν προς το τέλος της εβδομάδος.</p> <p>Συνιστάται ψεκασμός σε όλα τα αμπέλια το διάστημα 12 – 13 Ιουνίου. Να χρησιμοποιηθούν διασυστηματικά ή διελασματικά σκευάσματα. Το ψεκαστικό υγρό να βρέχει καλά το φύλλωμα και τα σταφύλια.</p>
<p>ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)</p>	<p>Παρατηρούνται εκτεταμένες προσβολές και επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση του.</p> <p>Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον περονόσπορο.</p>
<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ (<i>Lobesia botrana</i>)</p> <p>Όψιμες περιοχές ⇒</p> <p>Πρώιμες περιοχές ⇒</p> <p>Ενδιάμεσες περιοχές ⇒ (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης)</p>	<p>Η δραστηριότητα του εντόμου ξεκίνησε και στις όψιμες περιοχές. Συνιστάται ψεκασμός στις παρακάτω ενδεικτικές περιοχές και ημερομηνίες: (<i>Αλάγνι, Χουμέρι, Καστέλλι Πεδιάδος, Λαράνι, Αγ.Βαρβάρα, Δαμάστα, Μυλοπόταμος κλπ.</i>)</p> <p>Επιτραπέζια: 15 - 16 Ιουνίου. Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 18 - 20 Ιουνίου.</p> <p>Επαναληπτικός ψεκασμός:</p> <p>Επιτραπέζια: 13 - 14 Ιουνίου. Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 16 - 17 Ιουνίου.</p> <p>Επιτραπέζια: 15 - 16 Ιουνίου. Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 18 - 19 Ιουνίου.</p> <p>Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Σημείωση. Η οδηγία για την ευδεμίδα αφορά τα αμπέλια που βρίσκονται στους νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Για τα αμπέλια του νομού Χανίων θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.</p>

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Η επιλογή των σκευασμάτων να γίνεται από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 11 Ιουνίου 2015
Η Προϊστάμενη Τμήματος
a.a.
Οικονομάκη Ροζάνα