

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ



Λεκάνιο: Προσβεβλημένα φύλλα με καπνιά, ενήλικα λεκάνια και ανήλικα στάδια.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

18.

Παρατηρήσεις υπαίθρου: Ρ. Οικονομάκη, Ρ. Ηλιάκη, Μ. Ροδιτάκη

ΛΕΚΑΝΙΟ:

(*Saissetia oleae*)

Διαπιστώσεις:

Είναι κοκκοειδές (ψώρα) που προσβάλλει φύλλα και βλαστούς και προκαλεί εξασθένιση των δέντρων. Στα μελιτώματα που απεκκρίνει αναπτύσσονται μύκητες της καπνιάς. Προσβολές ευνοούνται σε περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία (παραθαλάσσιες, ρεματιές, απάνεμες) και σε δέντρα που διατηρούν αρκετή υγρασία στο πυκνό τους φύλλωμα (ακλάδευτα, ποτιστικά).

Τη φετινή χρονιά παρατηρούνται περιορισμένες προσβολές και πολύ υψηλός παρασιτισμός. Οι ξηροθερμικές συνθήκες δρουν περιοριστικά στην εξέλιξη επιζήμιων πληθυσμών.

<i>Οδηγίες:</i>	<p>Το λεκάνιο αντιμετωπίζεται κυρίως με καλλιεργητικά μέτρα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κατάλληλο κλάδεμα που επιτρέπει να αερίζεται και να λιάζεται το εσωτερικό των δέντρων. - Ισορροπημένες αζωτούχες λιπάνσεις και αρδεύσεις. <p>Στα δέντρα που διαπιστώνετε σοβαρή προσβολή συστήνεται <u>χημική καταπολέμηση</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πρώιμες και παραλιακές περιοχές: 20 - 23 Ιουνίου - Μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές: 25 - 28 Ιουνίου
<i>Συστάσεις:</i>	<p>Επειδή το λεκάνιο έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς, αρπακτικά και παρασιτοειδή που περιορίζουν τους πληθυσμούς του σε χαμηλά επίπεδα, προτείνεται η χρήση εντομοκτόνων χαμηλής τοξικότητας (παραφινικά λάδια, buprofezin, fenoxycarb, pyriproxifen). Όταν χρησιμοποιείτε τα παραφινικά λάδια πρέπει τα δέντρα να είναι καλά ποτισμένα και η θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 32° C.</p>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών της ελιάς να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 16 Ιουνίου 2016

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη