



No 37 / 4 Ιουνίου 2014

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ*(Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)*

- Η 1^η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Άρνισσας (Α.Σ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ), του Βελβεντού (ΑΣΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ"), της Πτολεμαΐδας (Α.Σ. ΠΥΡΓΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ), της Πέλλας (NOVAFARM Α.Ε.) και της Φλώρινας (Δ.Α.Ο.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ).
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

| | | Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο) |
|--|---|---|
| Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων | 12-14 Ιουνίου* | Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2) |
| Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών | 9-11 Ιουνίου * και επανάληψη μετά από 14-21 ημέρες | Methoxyfenozide (3) |
| Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών | 12-14 Ιουνίου* και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ | Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Deltamethrin (1), Etofenprox (2), Indoxacarb (3), Lambda cyhalothrin (2) |

- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- *Οι προτεινόμενες ημερομηνίες υπολογίστηκαν με την προϋπόθεση ότι έγινε επέμβαση για την Ανάρσια, όπως προτάθηκε στο δελτίο νο 31-16/5. Σε περίπτωση που δεν έγινε η επέμβαση για την Ανάρσια, οι ημερομηνίες για την καταπολέμηση του Φυλλοδέτη να μετατεθούν 4 ημέρες νωρίτερα.
- Η επέμβαση για τον Φυλλοδέτη καταπολεμά αποτελεσματικά και την Ανάρσια (*Anarsia lineatella* Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae) και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαγα ροδακινιάς) (*Grapholitha molesta* Busck, Lepidoptera: Tortricidae).

ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη