



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

28/22-5-13

### **A. ΕΛΙΑ**

#### **1. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ**

##### **Διαπιστώσεις:**

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη με υψηλές συλλήψεις, σε πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

##### **Οδηγίες:**

**Σε ελαιώνες με μέτρια καρπόδεση να γίνει επέμβαση ως εξής:**

**α. Από 28 Μάη ως 1 Ιουνίου στις πρώιμες περιοχές.**

**β. Από 2 -7 Ιουνίου στις μεσοπρώιμες περιοχές.**

**γ. Στις όψιμες περιοχές από 8-12 Ιουνίου.**

##### **Φυτ/κά προϊόντα:**

*Δελταμεθρίν, Λάμδα Συαλοθρίν, Μπέτα-συφλουθρίν, Πυρεθρίν,  
Χλωπυριφός μεθύλ.*

### **2. ΡΥΓΧΙΤΗΣ**

##### **Οδηγίες:**

**Σε ελαιώνες που την προηγούμενη χρονιά υπήρχαν προσβολές από ρυγχίτη, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον πυρηνοτρήτη.**

### **B. ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ**

#### **1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Ορεινές περιοχές)**

##### **Διαπιστώσεις:**

Η πρώτη πτήση του εντόμου στις ορεινές περιοχές βρίσκεται σε εξέλιξη, με μέτριους πληθυσμούς.

##### **Οδηγίες-**

##### **Φυτ/κά προϊόντα:**

**Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών να γίνει επαναληπτική επέμβαση με την λήψη του δελτίου,**

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) - επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Δελταμεθρίν, (Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Συφλουθρίν, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωπυριφός, Χλωπυριφός μεθύλ.*



## **Γ. ΚΕΡΑΣΙΑ**

### **1. ΜΟΝΙΛΙΑ**

#### **Συμπτώματα:**

Ο μύκητας μπαίνει στον καρπό από σκασίματα που δημιουργούνται από διάφορες αιτίες (ακανόνιστα ποτίσματα έντονες βροχοπτώσεις κ.α.) και δημιουργεί σάπισμα στους καρπούς. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της σήψης.

#### **Οδηγίες :**

**Να γίνει άμεσα επέμβαση με τη λήψη του δελτίου.**

**Τα ποτίσματα (όπου γίνονται), να σταματούν μερικές μέρες πριν την συγκομιδή.**

#### **Φυτ/κά προϊόντα:**

{*Θιράμ* -14 μέρες πριν τη συγκομιδή}, {*Θειοφανεΐτ-μεθύλ* μία μόνο επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο 14 μέρες πριν τη συγκομιδή}, {*Μπροσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν*-7 μέρες πριν τη συγκομιδή}, {*Ντιθιανόν* - 28 μέρες πριν τη συγκομιδή }, {*Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ*-1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο 7 μέρες πριν τη συγκομιδή}, {*Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ* 3 μέρες πριν τη συγκομιδή}.

### **2.ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ(Σκουλήκι των κερασιών)**

#### **Οδηγίες :**

**Στις πρώιμες ποικιλίες να μην γίνει επέμβαση. Στις όψιμες ποικιλίες, να γίνει ψεκασμός στο τέλος Μάη, σε όλες τις περιοχές.**

#### **Φυτ/κά προϊόντα:**

{Βιολογικό εντομοκτόνο με βάση σπόρια του μύκητα *Beauveria bassiana* 0 ημέρες}, {*Δελταμεθρίν*- 7 μέρες πριν τη συγκομιδή }, {*Θιαμεθοξάμ*-7 μέρες πριν τη συγκομιδή}.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- 1. Προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην κερασιά. ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΩΣ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ**
- Σε περιπτώσεις χαλαζόπτωσης καλό είναι να γίνεται άμεση επέμβαση - μέσα στο πρώτο 24ωρο- με ένα μυκητοκτόνο επειδή οι πληγές που δημιουργούνται είναι πύλες εισόδου διαφόρων παθογόνων.
- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ