

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkrpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον



Στάδιο D : Έξοδος των φύλλων.



Στάδιο E : Δεύτερο φύλλο ξεδιπλωτό και απομάκρυνση από την κληματίδα.



Στάδιο F : 4 -5 ξεδιπλωμένα φύλλα και εμφάνιση σταφυλιών.



Φόμωση. Προσβεβλημένη κληματίδα (δεξιά) και μόλυνση νεαρού βλαστού την άνοιξη (αριστερά).



Ωίδιο. Αρχικά μολύσματα.



Θρίπες.

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Πληροφορίες : Ν. Ι. Μπαγκής,- Ε. Α. Αλατσατιανός

2.

Η βλάστηση των αμπελώνων στις πρώιμες και ενδιάμεσες περιοχές σταδιακά έχει ξεκινήσει, παρουσιάζοντας διαφοροποίηση ανάλογα με την ποικιλία και τους χειρισμούς. Όσο αφορά την ποικιλία σουλτανίνα, στην πρώιμη - παραλιακή ζώνη καταγράφεται μέχρι και έναρξη σταδίου E (ξεδιπλωμα φύλλων), στην μεσοπρώιμη τα μάτια ανοίγουν (στάδια C-D, έξοδος φύλλων) ενώ στην όψιμη ζώνη τα μάτια ξεκινούν να φουσκώνουν. Με την έναρξη της βλάστησης συνιστώνται και οι πρώτες επεμβάσεις.

<p>ΦΟΜΟΨΗ: (<i>Phomopsis viticola</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες :</p>	<p>Ασθένεια ξύλου. Οι βροχοπτώσεις και η σχετικά χαμηλή θερμοκρασία που επικρατούν ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας σε αμπελώνες που βρίσκονται στα βλαστικά στάδια D και E (μήκος βλάστησης περίπου 1-3 εκ.). Ψεκασμός γίνεται μόνο όταν η βλάστηση βρίσκεται μεταξύ των σταδίων D και E.</p> <p>Σε αμπελώνες που κατά το κλάδεμα διαπιστώθηκε η ασθένεια συνιστώνται δύο ψεκασμοί. Ο πρώτος ψεκασμός στην έξοδο των φύλλων (στάδιο D) και ο δεύτερος όταν εμφανίζονται τα πρώτα φύλλα (στάδιο E).</p>
<p>ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)</p> <p>(χολέρα)</p> <p>Οδηγίες :</p>	<p>Ασθένεια που ευνοείται από τις κλιματικές συνθήκες της Κρήτης και εμφανίζεται κάθε χρόνο. Η προστασία πρέπει να αρχίζει από τα βλαστικά στάδια E , F ώστε να μειώνονται σημαντικά τα αρχικά μολύσματα.</p> <p>Κατάλληλος χρόνος αντιμετώπισης, όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 - 6 εκατοστά (στάδια E και F).</p>
<p>ΘΡΙΠΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ: (<i>Drepanothrips reuteri</i>)</p> <p>Οδηγίες :</p>	<p>Με την έκπτυξη των οφθαλμών (στάδια D και E) εμφανίζονται τα πρώτα ακμαία. Από δειγματοληψίες σε αμπελώνες της πρώιμης ζώνης δεν έχει επισημανθεί ακόμα η παρουσία τους.</p> <p>Συνιστάται στους παραγωγούς σταφυλιών για επιτραπέζια χρήση να ελέγχουν τα αμπέλια τους για την ύπαρξη θρίπα χτυπώντας πάνω σε λευκό χαρτί βλαστούς που βρίσκονται στα στάδια D και E, αφού αφαιρεθούν από το πρέμνο.</p> <p>Για την εξέλιξη του εντόμου θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.</p>

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας αποστέλλουμε τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού για το έτος 2014, τις οποίες παρακαλούμε **να κρατήσετε σε αρχείο**. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου επιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσματα από τις λίστες αυτές.

Ηράκλειο 10 Μαρτίου 2014
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης