

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον



Στάδιο C: Πράσινη
Κορυφή



Στάδιο D: Έξοδος
των φύλλων.



Στάδιο E: Δεύτερο φύλλο
ξεδιπλωτο και απομάκρυνση
από την κληματίδα.



Στάδιο F: 4 -5
ξεδιπλωμένα φύλλα και
εμφάνιση σταφυλιών.



Φόμοψη. Προσβεβλημένη
κληματίδα (δεξιά) και μόλυνση
νεαρού βλαστού την άνοιξη
(αριστερά).



Ωίδιο. Αρχικά μολύσματα.



Θρίπες.

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Πληροφορίες: Ν. Ι. Μπαγκής.- Ε. Α. Αλατοσατιανός

3.

Η βλάστηση σταδιακά ξεκινάει στις πρωιμότερες περιοχές. Οι πρώτες επεμβάσεις στα αμπέλια σχετίζονται με συγκεκριμένα βλαστικά στάδια.

<p>ΦΟΜΟΨΗ: (<i>Phomopsis viticola</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>- Ασθένεια ξύλου. Οι προσβεβλημένες κληματίδες είναι ξερές (κούφιας, γκριζόλευκες με μικρά μαύρα στίγματα) και οι οφθαλμοί δεν εκπιτύσσονται.</p> <p>- Η μέγιστη ευαισθησία της βλάστησης είναι από την έκπτυξη μέχρι και το στάδιο Ε.</p> <p>Σε αμπέλια που κατά το κλάδεμα διαπιστώθηκε η ασθένεια συνιστώνται ψεκασμοί κατά την ευαίσθητη περίοδο από την έναρξη της βλάστησης (στάδιο C) και μέχρι την εμφάνιση των πρώτων φύλλων (στάδιο D) πριν από προβλεπόμενη βροχή.</p>
<p>ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)</p> <p>(χολέρα)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>- Η σοβαρότερη ασθένεια των αμπελιών της Κρήτης. Ζημιώνει κάθε χρόνο ποιοτικά και ποσοτικά την παραγωγή εάν δεν αντιμετωπιστεί.</p> <p>- Τα αρχικά μολύσματα ξεκινούν από μολυσμένους οφθαλμούς από την περασμένη χρονιά. Η ασθένεια πρέπει να αντιμετωπιστεί προληπτικά.</p> <p>Κατάλληλος χρόνος αντιμετώπισης, όταν η βλάστηση βρίσκεται στο στάδιο F.</p>
<p>ΘΡΙΠΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ: (<i>Drepanothrips reuteri</i>, <i>Frankliniella occidentalis</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>- Οι ζημιές γίνονται κατά την άνθηση και είναι αντιληπτές κατά την ωρίμανση.</p> <p>- Η εμπορική αξία των επιτραπέζιων σταφυλιών μειώνεται λόγω της εμφάνισης εσχάρωσεων στις ράγες που είναι ιδιαίτερα εμφανείς στις λευκές ποικιλίες.</p> <p>Συνιστάται οι παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών να αφαιρούν βλαστούς που βρίσκονται στα στάδια D και E και να τους χτυπούν σε λευκό χαρτί. Σε περίπτωση που υπάρχουν θρίπες να γίνεται επέμβαση.</p>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας αποστέλλουμε τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού για το έτος 2015, τις οποίες παρακαλούμε **να κρατήσετε σε αρχείο**. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου επιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσματα από τις λίστες αυτές.

Ηράκλειο 16 Μαρτίου 2015

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη