



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.



Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

16/ 19-4-16

ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Η πρώτη πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

**Οδηγίες
Φυτ/κά
προϊόντα:**

Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1.Μέχρι 25 Απρίλη με: *Αμπαμεκτίν+Χλοραντраниλιπρόλ, Ντιφλουμπενζουρόν, Φενοξυκάρμπ, Χλοραντраниλιπρόλ.*

2. Από 26 μέχρι τις 29 Απρίλη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Μεθοξυφenoζάντ, Τεμπουφenoζάντ.*

3.Από 30 Απρίλη ως 3 Μάη με:

Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα σουφλουθρίν, Σπινοςάντ, Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Χλωπυριφός μεθύλ.

Στις κυδωνιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Από 26 μέχρι τις 29 Απρίλη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2. Από 30 Απρίλη ως 3 Μάη με:

Δελταμεθρίν, Χλωπυριφός μεθύλ, Χλωπυριφός.

Στις αχλαδιές και κυδωνιές των ορεινών περιοχών να μην γίνει επέμβαση για την καρπόκαψα. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

2.ΨΥΛΛΑ

Διαπιστώσεις: Στις δειγματοληψίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη νυμφών τελευταίων σταδίων, λίγες νέες εναποθέσεις αυγών και ακμαία.

Οδηγίες: **Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. Καλό είναι να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα και με ωοκτόνο δράση.**

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για την σωστή αντιμετώπιση του εντόμου να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών και να τηρείται αυστηρά ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, για κάθε δραστική ουσία. Η χρήση θερινού πολτού συνεργιστικά σε δραστικές ουσίες που επιτρέπεται, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.



**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ακριναθρίν, Αμπαμεκτίν (δρά και σε ηλικιωμένες νύμφες N5), Αμπαμεκτίν+Χλωραντρανιλιπρόλ (δρά σε αυγά και νύμφες), Ιμιντακλοπρίντ, Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν (δρά σε αυγά και νύμφες), Σπινοςάντ, Σπιροτετραμάτ (δρά σε νύμφες), Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Φενοξυκάρμπ (δρά σε αυγά και νύμφες), Χλωπυριφός μεθύλ.

ΑΧΛΑΔΙΑ - ΜΗΛΙΑ

1. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. Σε οπωρώνες που δεν υπάρχουν προσβολές να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με προστατευτική δράση.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Οδηγίες:

Να γίνονται συχνότατα επιτόπιοι έλεγχοι. Όταν διαπιστώνετε προσβολές να λαμβάνονται τα αναφερόμενα σε προηγούμενο δελτίο καλλιεργητικά μέτρα.

3. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΜΗΛΙΑ

Οδηγίες:

**Η έναρξη της πτήσης αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
Να μην γίνει επέμβαση. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Με βάση τον Καν (ΕΕ)2016/60 έγινε τροποποίηση της έγκρισης των ΦΠ με δραστική ουσία το χλωρπυριφός. Σε αχλαδιές απαγορεύεται η χρήση του μετά την άνθηση.
- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ