



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**

**ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

**Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου**

**22 / 4-5-15**

**ΑΜΠΕΛΙ**

**1. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ**

**Διαπιστώσεις:** Εμφανίστηκαν οι πρώτες προσβολές σε πρώιμες περιοχές με υγρασία. Το βλαστικό στάδιο είναι ευαίσθητο στις προσβολές και οι βλαστοί επιμηκύνονται πολύ γρήγορα.

**Οδηγίες:** Σε αμπελώνες των πρώιμων περιοχών του Ν. Κορινθίας να εντατικοποιηθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι με ιδιαίτερη προσοχή σε κτήματα που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία, υπάρχει ιστορικό προσβολών και σε ευαίσθητες ποικιλίες. Όπου διαπιστώνονται προσβολές να επεμβαίνετε άμεσα.

**Στους αμπελώνες των όψιμων περιοχών να γίνει προληπτική επέμβαση (μήκος της νέας βλάστησης 8-10 εκατ.)**

Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης οι προληπτικές επεμβάσεις εξασφαλίζουν προστασία για μικρό χρονικό διάστημα (4-7 ημέρες).

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

**2. ΩΙΔΙΟ**

**Οδηγίες:**

**Ο κίνδυνος μολύνσεων από τον μύκητα είναι μεγάλος. Συχνοί επιτόπιοι έλεγχοι (δύο φορές την εβδομάδα), αφαίρεση και καταστροφή προσβεβλημένων βλαστών και επέμβαση με κατάλληλο μυκητοκτόνο.**

**Η εξασφάλιση καλού αερισμού μειώνει τις προσβολές.**

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

**3. ΒΟΤΡΥΤΗΣ**

Ιδανικές συνθήκες για μολύνσεις είναι θερμοκρασίες 15-25 °C με βροχή ή υγρασία. Προσβάλλονται κορυφές βλαστών, βάσεις τρυφερών βλαστών, ταξιανθίες.

**Οδηγίες:**

**Σε περιοχές που υπάρχει ιστορικό προσβολών από τον μύκητα και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, να γίνει επέμβαση στο στάδιο του μούρου. Επέμβαση να γίνεται μετά από χαλαζόπτωση ή ισχυρούς ανέμους.**



### **Καλλιεργητικά μέτρα**

- Εξασφάλιση καλών συνθηκών αερισμού και φωτισμού.
- Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης.
- Καταστροφή των ζιζανίων.
- Συχνοί επιτόπιοι έλεγχοι.
- Αποτελεσματική αντιμετώπιση ωιδίου, ευδεμίδας,

### **Φυτ/κά προϊόντα:**

*Aureobasidium pullulans strain 14940 & 14941 Bacillus subtilis strain, Θιράμ (μόνο σε οινοποιήσιμα) Ιπροντιόν, Μεπανιπυρίμ, Μποσκαλίντ, Πυριμεθανίλ, Συπροντινίλ+ Φλουντιοξονίλ, Φενχεξαμίντ, Φλουαζινάμ.*

### **4.ΘΡΙΠΕΣ Οδηγίες:**

**Έλεγχος ανθοταξιών λίγο πριν την άνθηση. Με ελαφριά τινάγματα πάνω σε λευκό χαρτί μπορείτε να διαπιστώσετε την πυκνότητα του πληθυσμού τους. Σε επιτραπέζιες ποικιλίες που θα διαπιστωθούν υψηλοί πληθυσμοί, να γίνει επέμβαση.**

### **Φυτ/κά προϊόντα:**

*Αμπαμεκτίν, Λάμπντα συαλοθρίν, Μεθιοκάρμπ, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Φορμετανείτ.*

### **5.ΕΥΔΕΜΙΔΑ Οδηγίες:**

**Να μην γίνει επέμβαση. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.**

### **Φυτ/κά προϊόντα:**

**Βλέπε προηγούμενο δελτίο.**

### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. **Να γίνεται εναλλαγή στις χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.**
3. **Οι εφαρμογές των δραστικών ουσιών να μην υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αναγραφόμενο αριθμό.**
4. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**