

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkrpfhgpr@otenet.gr


Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

10.



Ευδεμίδα. Αυγό σε ράγα.



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγα.



Περωνόσπορος.
Κηλίδες λαδιού στην
πάνω επιφάνεια του
φύλλου.



Περωνόσπορος. Οι «λαδιές»
με υγρασία δίνουν λευκές
χιονώδεις εξανθήσεις μόνο
στην κάτω πλευρά του
φύλλου.



Ωίδιο. Κηλίδες όπως φαίνονται στην
πάνω επιφάνεια. Είναι πιο ανοιχτού
χρώματος και λιγότερο έντονες από τον
περωνόσπορο.



Ωίδιο. Αλευρώδες επιχρισμα (σπόρια)
σε φύλλα - βλαστό και κατσάρωμα
του φύλλου.



Ωίδιο. Προσβολή σε σταφύλια
με εμφάνιση σπορίων.

<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ (<i>Lobesia botrana</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Η δεύτερη πτήση ξεκίνησε και στις μεσοπρώιμες περιοχές και διαπιστώνονται οι πρώτες ωτοκίες.</p> <p>Συνιστάται αντιμετώπιση στις παρακάτω ενδεικτικές περιοχές και ημερομηνίες:</p> <p>Μεσοπρώιμες περιοχές (όπως Αρχάνες, Δαφνές, Βενεράτο, Αυγενική, Αγ.Μύρων, Κοπαρίσι, Πρ. Ηλίας, Βαγιωνιά, Γκαγκάλες, Σοκαράς, Ασήμι, Πραιτώρια, Πύργος, Χάρακας, Μεσοχωριό, Γαρίπα, Λιγόρτυνο, Τεφέλι, Μυρτιά, Επισκοπή, Αγ. Παρασκιές κ.λ.π.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Επιτραπέζια: 9 - 10 Ιουνίου. - Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 11 - 13 Ιουνίου. <p>Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.</p> <p>Σημείωση. Η οδηγία για την ευδεμίδα αφορά τα αμπέλια που βρίσκονται στην μεσοπρώιμη ζώνη των νομών Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Για τις όψιμες περιοχές των παραπάνω νομών καθώς και για τις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές του νομού Χανίων θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.</p>
<p>ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Παρατηρούνται εκτεταμένες προσβολές που προβλέπεται να αυξηθούν το επόμενο διάστημα.</p> <p>Τα μελτέμια λόγω της υγρασίας που μεταφέρουν και οι συχνές συννεφιάς σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία, προκαλούν συνεχείς μολύνσεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να γίνεται συστηματική αντιμετώπιση με εναλλαγή σκευασμάτων από διαφορετικές ομάδες δράσης. • Σε αμπέλια με ανεξέλεγκτες προσβολές να προτιμηθεί το θειάφι σε σκόνη επίπασης ιδιαίτερα όταν μετά την εφαρμογή του επικρατεί ξηρός καιρός με ηλιοφάνεια.
<p>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: (<i>Plasmopara viticola</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>– Οι κατά τόπους βροχές στις 28 - 29 Μαΐου στις περιοχές που σημειώθηκαν έδωσαν νέες μολύνσεις και η ασθένεια εξαπλώθηκε τοπικά περαιτέρω.</p> <p>– Βάσει των καιρικών συνθηκών που επικρατούν αυτήν την περίοδο χρειάζεται συνεχής επιτήρηση και ιδιαίτερα σε αμπέλια της ημιορεινής και ορεινής ζώνης.</p> <p>Σε αμπέλια και τοποθεσίες που έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα, να γίνονται ψεκασμοί κατά διαστήματα, ιδιαίτερα σε περιόδους με έντονες δροσιές ή πρόβλεψη βροχής.</p>
<p>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca spp</i>)</p>	<p>Να συνεχιστεί ο συστηματικός έλεγχος στην ακραία βλάστηση και όπου εμφανίζεται να γίνεται άμεσα επέμβαση.</p>
<p>ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ: (<i>Planococcus ficus</i>)</p>	<p><u>Στις μεσοπρώιμες περιοχές, σε αμπέλια για επιτραπέζια χρήση</u> που εντοπίζονται πληθυσμοί στον κορμό και στις κατώτερες κληματίδες να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα με καλή διαβροχή του κορμού και των βραχιόνων.</p>

- Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Οι επεμβάσεις να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε στείλει.

*Ηράκλειο 8 Ιουνίου 2015
Η Προϊστάμενη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη*