

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Τ.Κ.: 651 10 Τ.Θ.: 1235

ΤΗΛ. 2510 600421

FAX: 2510 600430

e mail : pkpfpeka@otenet.gr

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΥ

No 13/03-06-2016

ΕΛΙΑ

Πυρηνοτρήτης (*Prays oleae*)

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου έχει ξεκινήσει στις πρώιμες και στις όψιμες περιοχές.



Το ενήλικο του πυρηνοτρήτη έχει μήκος 6 - 6,5 και άνοιγμα πτερύγων 13 - 15 χιλιοστά.

Ψεκασμοί :

Στις πρώιμες περιοχές η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο όπου ο καρπός έχει μέγεθος 3 - 5 χιλιοστά.

Σε αυτό το στάδιο να γίνει ο πρώτος ψεκασμός. Στις επιτραπέζιες ελιές ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από περίπου 15 ημέρες ανάλογα με την υπολειμματικότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Στις όψιμες περιοχές ο πρώτος ψεκασμός να γίνει μία εβδομάδα αργότερα.

Παρλατόρια (*Parlatoria oleae*)

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε ελαιοκτήματα όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη. Εάν έγινε καταπολέμηση της παρλατόριας προανθικά με εντομοκτόνο (ρυθμιστής ανάπτυξης), δεν απαιτείται ψεκασμός.

Ακάρεια

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες και όπου δεν έγινε αποτελεσματική καταπολέμηση λόγω συνεχών βροχοπτώσεων, θα πρέπει να γίνει άμεσα ένας ψεκασμός με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση των ακάρεων.

- ♦ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr (Γεωργικές προειδοποιήσεις).

Η Προϊσταμένη Τμήματος

κ.α.α.

Αδαμίδου Ζωή