



Ακραιο ευδεμιδας



Προνύμφη ευδεμιδας



Βοτρυτης



Ωιδιο

Ταχ. Δ/ση:

Αγ. Λουκάς

Τέρμα Αμυνταίου

65110 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ. : 2510800421

Φακ: 2510800430

Πληροφορίες: Κ. Λίλης-Δ.Πυργιώτη-
Θ. Μαρκόπουλος.

Τηλ:2510-600421-422-420

Αρ. Δελτίου:10/08-08-13

ΑΜΠΕΛΙ

I. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Η γ'πτήση του εντόμου της ευδεμιδας συνεχίζεται. Ο αριθμός των συλλήψεων στις στες φερομονικές παγίδες είναι από μέτριος έως πολύ υψηλός. Υπάρχει ακόμη κίνδυνος προσβολής των σταφυλιών.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνουν προληπτικά οι παρακάτω ψεκασμοί:

- **12 -13 Αυγούστου** στις πρώιμες περιοχές
- **13 -14 Αυγούστου** στις μεσοπρώιμες περιοχές και
- **15 -16 Αυγούστου** στις όψιμες περιοχές

Επανάληψη μετά από **7 - 8** ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη την υπολειμματική διάρκεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το στάδιο ωρίμανσης των σταφυλιών.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ευδεμιδας. Σε σταφύλια που βρίσκονται στο στάδιο ωρίμανσης να προτιμηθούν σκευάσματα του βάκιλλου θουριγγίας.

II.ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Συνιστάται να γίνει προληπτικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν,σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ευδεμιδας.Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπέλια όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο κατά το στάδιο ωρίμανσης των σταφυλιών.

Συστηλή χρήση
φυτοφαρμάκων
σημαίνει



καλύτερη
φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία

της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες
που το ζητούν



Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε νέα δραστική ουσία (Aureobasidium pullulans) για την αντιμετώπιση του βοτρυτή, η οποία δεν υπάρχει στη λίστα που σας έχουμε αποστείλει.

III. ΩΙΔΙΟ

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση της ασθένειας, στις όψιμες κυρίως ποικιλίες, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Σταφύλια ώριμα ή σταφύλια που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης δεν ψεκάζονται.

IV. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα αμπέλια τους και αν παρατηρήσουν την ύπαρξη του εντόμου θα πρέπει να γίνει καταπολέμηση ακόμη και αυτή την περίοδο, κυρίως στις όψιμες ποικιλίες.

V. ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Εμφανίζεται από το ξεκίνημα της ωρίμανσης των σταφυλιών και εκτείνεται κατά την πλήρη ωρίμανση αυτών. Οφείλεται σε βακτήρια και ζακχαρομύκητες. Μεταδίδεται με το έντομο δροσόφιλα(μύγα του ξυδιού).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Σωστή καταπολέμηση της ευδεμίδας, αποφυγή πληγών στα σταφύλια, καθαρισμός των ραγών και έγκαιρος ψεκάσμος με μια πυρεθρίνη. Για αποφυγή εμφάνισης όξινης σήψης χρειάζεται σωστή αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών σύμφωνα με το υπ' αριθ. 03/08-04-2013 Τεχνικό Δελτίο της Υπηρεσίας μας.
2. Να χρησιμοποιηθούν γ. φάρμακα μικρής υπολειμματικής διάρκειας σε αμπέλια που πλησιάζουν στην ωρίμανση.
Σταφύλια έτοιμα προς συγκομιδή δεν ψεκάζονται
3. Όλοι οι παραπάνω ψεκάσμοι να γίνουν **μόνο** εφόσον λάβουμε υπόψη την **υπολειμματική διάρκεια** των γεωργικών φαρμάκων και το **στάδιο ωρίμανσης** των σταφυλιών και
4. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο

Προιστάμενος Δ/νσης

Αδαμίδου Ζωή