



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

**37/1-8-13**

## ΑΜΠΕΛΙ

### 1. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

#### Διαπιστώσεις:

Η 3<sup>η</sup> πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη με αραιές συλλήψεις, πληθυσμούς. Επακόλουθο των προσβολών, κυρίως αυτής της γενιάς, είναι οι σήψεις.

#### Οδηγίες:

Στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές, κυρίως σε επιτραπέζιες ποικιλίες που κρίνετε απαραίτητη την επέμβαση, αυτή να γίνει από 5 ως 9 Αυγούστου.

#### Φυτ/κά προϊόντα:

*Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες, { Πυρεθρίνς -2 μέρες}, { Άλφα σπυερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν-μπενζοειτ, Λάμδα Συαλοθρίν -7 μέρες}, { Ιντοξακάρμπ -10 μέρες}, { Ετοφενπρόξ, Εσφενβαλερέιτ, Μπέτα Συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Σπυερμεθρίν -14 μέρες}, { Χλωρπυριφός -20 μέρες}, { Χλωρπυριφός μεθύλ -21 μέρες}.*

## 2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

#### Οδηγίες:

Ελέγξτε τα αμπέλια με προσοχή. Όπου η προηγούμενη επέμβαση δεν ήταν αποτελεσματική και υπάρχουν πληθυσμοί, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

#### Φυτ/κά προϊόντα:

*{ Σπιροτετραμάτ- 14 μέρες}, { Χλωρπυριφός -20 μέρες}, { Χλωρπυριφός μεθύλ -21 μέρες}.*

## 3. ΒΟΤΡΥΤΗΣ

#### Οδηγίες:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

#### Φυτ/κά προϊόντα:

*{ Aerobasidium pullulans dsm14940 -0 μέρες } { Φενχεξαμίτ -14 μέρες για οιν/μα & 7 μέρες για επιτραπέζια}, { Ιπροντιόν - 21 μέρες}, { Φλουαζινάμ μόνο σε οινοποιήσιμα αυτή την εποχή - 21 μέρες}, { Μποσκαλίντ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ -28 μέρες}, { Πυριμεθανίλ-35 μέρες}, { Φολπέτ μόνο σε οινοποιήσιμα αυτή την εποχή - 42 μέρες}. ▶*

#### **4.ΩΙΔΙΟ**

##### **Διαπιστώσεις:**

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια. Υπάρχουν σποραδικές προσβολές σε αμπελώνες όψιμων περιοχών.

##### **Οδηγίες:**

Κίνδυνος προσβολών για τις ρόγες υπάρχει μέχρι το στάδιο του γυαλίσματος. Βλαστοί, ποδίσκοι και άξονες των σταφυλιών, είναι ευπαθείς καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο. **Ελέγξτε τα αμπέλια. Όπου υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση χρησιμοποιώντας σκεύασμα με θεραπευτική δράση.**

##### **Φυτ/κά προϊόντα:**

{Σπόρια του μύκητα *Ampelomyces quisqualis* -0 μέρες }, {Λαμιναρίν -0 μέρες }, {Θείο -7 μέρες}, {Φλουοπιράμ+Τεμπουκοναζόλ -14 μέρες μόνο σε οινοποιήσιμα}{Θείο + Οξυχλωριούχος χαλκός - 28 μέρες}, {Μπουπιριμέιτ -14 μέρες},{Αζοξιστρομπίν, Μεπτυλντινοκάπ, Μυκλομποουτανίλ, Συφλουφεναμίτ, Συφλουφεναμίτ+Ντιφenoκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ -21μέρες}, {Μετραφενόν, Προκουιναζίντ, Συπροκοναζόλ, Φενμπουκοναζόλ, Τριφλοξιστρομπίν -28 μέρες},{Κυνοξιφέν -30 μέρες για οιν/μα & 21 μέρες για επιτραπέζια},{Κρεσοξυμ μεθύλ, Μπoσκαλίτ+Κρεσόξιμ μεθύλ, Ντιμεθομόρφ+Πυρακλοστρομπίν, Πενκοναζόλ, Τριαντιμενόλ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόλ, Τεμπουκοναζόλ+Τριφλοξιστρομπίν - 35 μέρες}, {Φολπέτ+Τριαντιμενόλ., Αζοξιστρομπίν + Φολπέτ - 42 μέρες}.

#### **5.ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ**

##### **Διαπιστώσεις:**

Ελέγχετε συστηματικά τους αμπελώνες.

##### **Οδηγίες:**

Όπου εντοπίζετε προσβολές να γίνεται επέμβαση χρησιμοποιώντας σκεύασμα με προστατευτική και θεραπευτική δράση (Βλέπε προηγούμενο δελτίο).

##### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- **Οι ημέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή.**
- **Οι επεμβάσεις κοντά στη συγκομιδή εμπεριέχουν κινδύνους εύρεσης υπολειμμάτων άνω των επιτρεπόμενων ορίων στα σταφύλια. Να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά όρια μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.**
- **Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**
- Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**