

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616  
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

## ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑΣ (ΔΕΣΠΟΛΙΑΣ)



Λίγο πριν την άνθιση



Προσβολή σε καρπό

Πληροφορίες: Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός - Νίκος Ι. Μπαγκής

1.

<b>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ:</b> ( <i>Spilocaea pyracanthae</i> )	Προσβάλλει άνθη, φύλλα και καρπούς. Στον αναπτυγμένο καρπό εμφανίζονται ελαιοκαστανές κηλίδες σκούρου χρώματος που ανάλογα με την ένταση της προσβολής μπορεί να καλύπτει και ολόκληρο τον καρπό.
<b>Διαπιστώσεις:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Οι κλιματικές συνθήκες της Κρήτης στις περιοχές όπου καλλιεργείται ευνοούν την εμφάνιση και εξέλιξη της ασθένειας.</li><li>- Οι βροχές και οι δροσιές που σημειώνονται στο διάστημα λίγο πριν την άνθιση μέχρι και δυο βδομάδες μετά την καρπόδεση είναι καθοριστικές για την εκδήλωση και εξέλιξη της ασθένειας.</li></ul>
<b>Οδηγίες:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Απομάκρυνση των προσβεβλημένων από την ασθένεια καρπών της προηγούμενης περιόδου που μπορεί να βρίσκονται πάνω στο δέντρο ή στο έδαφος.</li><li>- Ψεκασμός των δέντρων στα παρακάτω βλαστικά στάδια:<ul style="list-style-type: none"><li>• Λίγο πριν την άνθιση</li><li>• Μετά την πτώση των πετάλων όπου φαίνεται το καρπίδιο</li><li>• 15 ημέρες μετά τον προηγούμενο</li></ul></li></ul>
<b>Χημική καταπολέμηση:</b>	Χρησιμοποιούνται σκευάσματα τα οποία περιέχουν μία από τις παρακάτω δραστικές: <ul style="list-style-type: none"><li>-Myclobutanil</li><li>-Dodine</li><li>-Copper oxychloride</li></ul>

<b>Παρατηρήσεις :</b>	Συστήνεται η προσθήκη προσκολλητικής - διαβρεκτικής ουσίας στο ψεκαστικό υγρό. Για καλύτερο έλεγχο της ασθένειας να προτιμούνται οι δραστικές με διασυστηματική δράση (Myclobutanil, Dodine).
-----------------------	--

*Ηράκλειο 24 Οκτωβρίου 2013  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης  
Τρουλλάκης Ιωάννης*