



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

18 / 7-4-14

Α. ΑΜΠΕΛΙ

1. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις:

Ο Απρίλης είναι ο προπαρασκευαστικός μήνας του περonosπόρου. Ο καιρός που επικρατεί από χθες δημιουργεί συνθήκες για μόλυνση. Εμφάνιση κηλίδων «ελαίου» 16-18 Απρίλη σε αμπελώνες πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών.

Οδηγίες:

Καλλιεργητικά μέτρα:

- Καλή αποστράγγιση του αμπελώνα
- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η νεαρή βλάστηση να μην είναι κοντά στο έδαφος και οι νεαρές κληματίδες που έρπουν την περίοδο της άνοιξης καθώς και οι βλαστοί γύρω από την βάση του πρέμνου να καταστρέφονται.
- Οι άκρες του αμπελώνα να καθαρίζονται έτσι ώστε να μην υπάρχουν θέσεις που μπορεί να ξεκινήσει η ασθένεια
- Συνεχής και επιμελημένος έλεγχος του αμπελώνα ιδιαίτερα των σημείων που συνήθως εμφανίζουν πρωταρχικές προσβολές
- Όπου εντοπίζονται κηλίδες «ελαίου» να καταστρέφονται αμέσως πριν εμφανιστούν καρποφορίες (εξάνθιση).
- Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καλό αερισμό των πρέμνων και στην μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό τους.

Χημική αντιμετώπιση

Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου στους αμπελώνες πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών που το μήκος της νέας βλάστησης είναι 8-10 εκατ.

Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης οι προληπτικές επεμβάσεις εξασφαλίζουν προστασία για μικρό χρονικό διάστημα (4-7 ημέρες).

Φυτ/κά προϊόντα:

*Αζοξυστρομπίν, Αμετοκραντίν+Μετιράμ, Μανκοζέμπ,
Μανκοζέμπ +Ζοξαμίντ, Μαντιπροπαμίντ,
Μαντιπροπαμίντ+χαλκός, Μαντιπροπαμίντ+ Μανκοζέμπ,
Μπεναλαξύλ+Μανκοζέμπ, Μπεναλαξύλ-μ+Μανκοζέμπ,*

*Μπεναλαξύλ+Χαλκός, Μεταλαξύλ+Χαλκός, Μειράμ,
Μπενθιαβαλικάρμπ-ισοπροϋλ+Μανκοζέμπ, Ντιθιανόν,
Ντιμεθομόρφ, Ντιμεθομόρφ + Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ +
Φολπέτ, Ντιθιανόν, Προπινέμπ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόλ,
Ντιμεθομόρφ+Πυρακλοστρομπίν, Συμοξανίλ+Χαλκός,
Συμοξανίλ+Μανκοζέμπ, Συμοξανίλ+Φαμοξαντόν,
Συμοξανίλ+Χαλκός, Φαμοξαντόν+Μανκοζέμπ,
Φεναμιντόν+Φοσετύλ-αλ, Φλουοπικολίντ+Φοσετύλ-αλ,
Φλουοπικολίντ+Προπινέμπ, Φολπέτ, Φολπέτ+Μεταλαξύλ,
Φολπέτ+Τριαντιμενόλ, Φολπέτ+Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ,
Φοσετύλ-αλ+Μανκοζέμπ, Χαλκός, Χαλκός+Θείο, Χαλκός+
Φολπέτ .*

2.ΩΙΔΙΟ
Οδηγίες:
Φυτ/κά
προϊόντα:

Συνδυασμένη καταπολέμηση με τον περονόσπορο.
Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Να γίνεται εναλλαγή στις χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας
3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ